

# hmeljarske informacije

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec  
Urednik: Gregor Leskošek, e-pošta uredništva: gregor.leskosek@ihps.si  
Uredniški odbor: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, dr. Sebastjan Radišek  
Naklada: 300izvodov.



ISSN 1408 - 4775


Letnik 33 , št. 10


26. julij 2016

G. Leskošek, M. Rak Cizej, S. Radišek: **VARSTVO HMEĽJA**

## Hmeljeva peronospora

V spodnjih grafih (slika 1) je prikazan ulov spor v zadnjem obdobju. Spore so prisotne na vseh lokacijah tik pod kritično mejo, razen na lokaciji Radlje kjer le to presegajo. V Savinjski dolini in na širšem območju je hmelj pri sortah Savinjski golding (BBCH 75 - napol razviti storžki, storžki so vidni, medli) in Aurora (BBCH 73 - začetek razvoja storžkov, 30% storžkov) prešel v fazo formiranja storžkov, pri Celeiah pa se zaključuje cvetenje (BBCH 69 - konec cvetenja).





Slika 1: Ulov spor v štirih zaporednih dneh na različnih lokacijah

Svetujemo vam, da v teh dneh opravite drugo škropljenje v cvet. V kolikor v nasadih nimate težav s hmeljevo peronosporo vam v prvi vrsti svetujemo uporabo enega od bakrovih pripravkov, ki ga uporabite v skladu z navodili iz letošnjega seznama dovoljenih FFS za varstvo hmelja na voljo pa imate tudi pripravek, Delan 700 WG ki ga uporabite v odmerku 1,2 kg /ha, ali pripravek Ortiva v odmerku 1,6 l/ha. Med omenjenimi pripravki kolobarite. Ponovno pa vas opozarjamo, da povsod tam kjer na listih opazite pege in imate še na razpolago enega od pripravkov iz skupine Aliette uporabite le tega v 0,25 % koncentraciji odmerki v tem času je med 5,5- 6,25 kg/ha odvisno od bujnosti nasada ali pa pripravek Revus v odmerku 1,6 l/ha. Uporaba pripravka Revus je dovoljena samo 2 - krat letno.

### ***Hmeljeva pepelovka***


Pri pepelovki velja še naprej opozorilo iz prejšnjih hmeljarskih informacij. Bolezen se v naših razmerah običajno prične pojavljati v času polnega cvetenja in je nevarna predvsem v nasadih občutljivih sort kot so Magnum, Dana, Celeia ter Bobek. Pri škropljenju tako preventivno uporabite enega žveplovih pripravkov v odmerku 6 kg/ha. V kolikor pa imate v nasadih že prisotno pepelovko pa poleg pripravkov na osnov žvepla uporabite tudi Systhane 20 EW v odmerku 1,5l/ha. Omenjeni pripravki lahko uporabite največ 2- krat letno.

### ***Hmeljeva pršica***

Na splošno lahko rečemo, da v tem času hmeljeva pršica ni množično prisotna v hmeljiščih vendar velja še naprej opozorilo, da pozorno in natančno spremljajte pojav hmeljeve pršice v nasadih in v kolikor je le ta prisotna ukrepajte v skladu z navodili iz hmeljarskih informacij št 8.

## Koruzna vešča

Na svetlobnih vabah v Žalcu in na Rojah že dober teden beležimo ulov metuljev koruzne vešče 2. generacije (graf 1). Trenutno še nismo našli prvih izleglih gosenic druge generacije tako, da v teh dneh, ko boste aplicirali predvsem fungicide, ni upravičeno dodajanje Lepinox-a ali Karate-ja. O primernem času uporabe pripravkov za zatiranje omenjene škodljivke vas bomo obvestili v eni od naslednjih številkih hmeljarskih informacij.



Graf 1: Let metuljev koruzne vešče na svetlobni vabi v Žalcu in na Rojah v letu 2016, v primerjavi z letom 2015

## I. J. KOŠIR: UMERJANJE VLAGOMEROV

V letošnjem letu bomo na Oddelku za agrokemijo in pivovarstvo umerjali vlagomere za določanje vlage v hmelju. Vlagomere lahko oddate na oddelku za agrokemijo in pivovarstvo do 10. 08. 2016. Cena za umerjanje vlagomera je 30,78 EUR. Obveščamo vas, da po navedenem datumu ne bo več možno izvajati umerjanja vlagomerov.