

## Podatki o publikaciji

**Izdaja:** Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,  
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

**Urednik:** Silvo Žveplan

**E-pošta uredništva:** [silvo.zveplan@ihps.si](mailto:silvo.zveplan@ihps.si)

**Uredniški odbor:** Silvo Žveplan, Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, Gregor Leskošek



ISSN 2536-2321 (za spletno izdajo)

Letnik 31, št. 04

29. april 2022

## ZATIRANJE PLEVELOV V KORUZI S HERBICIDI

V zadnjih dneh so na področju Savinjske doline in širše Celjske regije začeli s setvijo koruze. Trenutno je pri nas registriranih 70 selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v koruzi. Ukrep uporabe herbicidov se tako kot pri drugih gojenih rastlinah, tudi pri koruzi počasi, a vztrajno **nagiba k usmerjenemu zatiranju plevela po vzniku koruze in plevelov.**

Svetujemo vam, da s herbicidi navedenimi v spodnji preglednici »kolobarite« kar pomeni, da ne uporabljate istih pripravkov več let zapored, temveč jih čim večkrat zamenjate s pripravki z drugimi aktivnimi snovmi iz drugih kemičnih skupin.

**Priporočamo, da poskušate zatiranje plevelov pred vznikom koruze nadomestiti z zatiranjem plevelov po vzniku koruze.**

Za več informacij in lažjo odločitev prilagamo preglednico št. 1.

### Preglednica 1: Seznam selektivnih herbicidov, registriranih v RS za uporabo v koruzi v letu 2022

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe koruza BBCH	Karenca in opombe
ADENGO E.Š. in O. pl.	izoksaflutol + tienkarbazon	SC	0,44 L	Preem, Po do 13	KZ=ČU, KS ne silirati pred mlečno zrelostjo
*AKRIS, E. O. in E. Š. pl.	dimetenamid + terbutilazin	SE	3,0 L	Po 12-16	ČU, VPV, le 1x vsako 3. leto!
*ALISEO, E. in Večl. O. ter Š. pl.	nikosulfuron + rimsulfuron	WG	70 g	Po 12-18 + M	ČU
*ALISEO PLUS E in Večl. O. ter Š. pl.	dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron	WG	350 - 440 g	Po 12-16 + M	ČU
*ARIGO E in Večl. O. ter Š. pl.	mezotrion + nikosulfuron + rimsulfuron	WG	330 g	Po 12-18 + M	ČU
*ARRAT, E in Večl. Š. pl.	dikamba + tritosulfuron	WG	0,2 kg	Po 12-18 + M	ČU, 28 dni za klajo
*BANDERA O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	1,0 L	Po 12-18	ČU
*BANVEL 480 S E in Večl. Š. pl.	dikamba	SL	0,6 L	Po 12-18	ČU, Po 17-18 tretirati pod liste koruze!
*BASAGRAN 480 E in nek. Večl. Š. pl.	bentazon	SL	1,5- 2,0 L	Po 11-15	60 dni
*BENI, Š. pl.	bentazon	SG	1,0 kg	Po 14-18	ČU

# Obvestila poljedelcem

Fitofarmaceutsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe koroza BBCH	Karenca in opombe
<b>BOTIGA</b> nekateri E. Š. pl. in omejevanje številčnosti navadne kostrebe	mezotrion + piridat	OD	<b>1,0 L ali deljena aplikac. 0,5 + 0,5 L</b>	Po 12-18	ČU, KZ in KS
<b>*CALARIS PRO</b> E.Š. in nekatere vrste O. pl.	mezotrion + terbutilazin	SC	<b>2,0 – 2,3 L</b>	Preem, Po 09-14	ČU, VPV, le 1x vsako 3. leto!
<b>*CALLAM</b> , E in Večl. Š. pl.	dikamba + tritosulfuron	WG	<b>300 g</b>	Po 13-16 + M	ČU, ne za sladko koruzo!
<b>CALLISTO 480 SC</b> Š. pl. in navadna kostreba	mezotrion	SC	<b>0,25 – 0,3 L 0,15 – 0,25 L</b>	Preem, Po 09-18 + M	ČU
<b>CAPRENO</b> O. in Š. pl.	tembotrion + tienkarbazon-metil	SC	<b>0,3 L</b>	Po 12-16 + M	ČU
<b>*CLAP</b> , E. in Večl. Š. pl.	klopiralid	SL	<b>0,3 L</b>	Po 12-19	ČU
<b>*DICASH</b> , E. in Večl. Š. pl.	dikamba	SL	<b>0,6 L</b>	Po 12-18	ČU
<b>*DUAL GOLD 960 EC</b> E. O. in Š. pl.	S-metolaklor	EC	<b>1,0 - 1,5 L 1,0 - 1,3 L</b>	Preem izven VVO Po 09 -14	KZ= ČU, KS 91 dni v mešanici s sredstvom na osnovi <i>mezotriona</i> + M
<b>*EFICA 960 EC</b> E. O. in nekatere vrste E. Š. pl.	S-metolaklor	EC	<b>1,0 - 1,5 L 1,0 - 1,3 L</b>	Preem izven VVO Po 09 -14	KZ= ČU, KS 91 dni v mešanici s sredstvom na osnovi <i>mezotriona</i> + M
<b>*ELUMIS</b> , E. Š. in O. pl.	mezotrion + nikosulfuron	OD	<b>1,5 L</b>	Po 11-18	ČU
<b>*ENTAIL</b> , O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	<b>0,17 L</b>	Po 12-18	ČU
<b>EQUIP</b> , Š. in O. pl	foramsulfuron	OD	<b>2,0 - 2,5 L</b>	Po 12-16	ČU, VPV
<b>ESTERON</b> , E. Š. pl.	2,4 D 2-EHE	EC	<b>1,0 L</b>	Po 14-16	ČU
<b>FOCUS ULTRA</b> E in Večl. O. pl., samonikla žita	cikloksidim	EC	<b>1,0 – 4,0 L</b>	Po 12-19 + (M)	ČU, uporaba le v posevkih tolerantnih na <i>a.s. cikloksidim!</i>
<b>*FRONTIER X2</b> E. O. in nekatere vrste Š. pl.	dimetenamid -P	EC	<b>1,0 - 1,4 L</b>	pred setvijo inkorporacija, Preem	KZ =ČU, KS se lahko žanje v mlečni zrelosti
<b>HARMONY 50 SX</b> , Š. pl.	tifensulfuron-metil	SG	<b>22,5 g</b>	Po 12-18 + M	ČU
<b>HERBOCID XL</b> , Š. pl.	2,4-D	SL	<b>1,25 L</b>	Po 13-14	ČU
<b>*KALIMBA</b> , E in Večl. Š. pl.	dikamba	SL	<b>0,6 L</b>	Po 12-18	ČU
<b>*KAMBA 480 SL</b> , E in Večl. Š. pl.	dikamba	SL	<b>0,6 L</b>	Po 12-18	ČU
<b>*KELVIN**</b> , O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	<b>1,0 L</b>	Po 13-18	ČU, **zaloge v uporabi do 16.12.2022

# Obvestila poljedelcem

Fitofarmaceutsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe koruza BBCH	Karenca in opombe
*KELVIN MAX, O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	0,75 L ali deljena aplikacija 0,5 + 0,25 L	Po 12-18	ČU, ne za sladko koruzo!
*KELVIN OD, Š. in O. pl.	nikosulfuron	OD	1,0 L	Po 14-17	ČU
*KOBAN TX, Š. in O. pl.	petoksamid + terbutilazin	SE	4,0 L	Preem, Po 10-14	ČU, VPV, le 1x vsako 3. leto!
LAUDIS, O. in Š. pl.	tembotrion	OD	1,15 - 2,25 L	Po 12-18	ČU, mogoča split aplikacija
LAUDIS WG 30, O. in Š. pl.	tembotrion	WG	0,25 - 0,5 kg	Po 12-18 + M	ČU, mogoča split aplikacija
*LONTREL 100**, Š. pl.	klopirid	SL	1,0 - 1,2 L	Po 12-15	70 dni, **zaloge v uporabi do 30.4.2023
*LONTREL 72SG, Š. pl.	klopirid	SG	170 g	Po 12-19	ČU
*LUMAX E. O. in Š. pl.	S-metolaklor + terbutilazin + mezotrion	SE	3,25 - 4,0 L 3,0 - 4,0 L	Preem izven VVO Po 09-14	ČU, le 1x vsako 3. leto!
*LUMAX H 537,5 SE E. O. in Š. pl.	S-metolaklor + terbutilazin + mezotrion	SE	3,0 - 4,0 L	Preem izven VVO Po 09-14	ČU, VPV, le 1x vsako 3. leto!
MERLIN FLEXX E. Š. in nekateri O. pl.	izoksafutol	SC	0,3 L 0,4 L	Preem, Po 09- 13	KZ=ČU, KS ne pred mlečno zrelostjo, Po - le samostojno!
*MILAGRO 240 SC O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	0,17 L	Po 12-18	ČU
*MILAGRO EXTRA 6 OD O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	0,75 L ali deljena aplikacija 0,5 + 0,25 L	Po 12-18	ČU, ne za sladko koruzo!
*MILAGRO PLUS E. ter Večl. Š. pl. in O. pl.	dikamba + nikosulfuron	OD	0,8 L	Po 12-18	ČU
MONSOON ACTIVE E.O. in Š.pl. (ter divji sirek)	foramsulfuron + tienkarbazon-metil	OD	1,5 L ali 0,75 + 0,75 L (2,0 L ali 1,0 + 1,0 L)	Po 12-16, deljena aplikacija Po 12-18	ČU, VPV, mogoča deljena aplikacija
*MOTIVELL, O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	1,0 L	Po 12-18	ČU, ne za sladko koruzo!
*MOTIVELL EXTRA 6 OD O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	0,75 L ali deljena aplikacija	Po 12-18	ČU, ne za sladko koruzo!

# Obvestila poljedelcem

Fitofarmaceutsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe koruza BBCH	Karenca in opombe
			0,5 + 0,25 L		
<b>*MURAL</b> E in nekatere vrste Večl. Š. pl.	dikamba	SL	0,6 – 0,75 L	Po 12-15	ČU, ne za semensko, ne za sladko in ne za koruzo s podsevkom!
<b>MUSTANG 306 SE</b> E. in nekat. Večl. Š. pl.	florasulam + 2,4 D 2-EHE	SE	0,5 - 0,6 L	Po 14-15	ČU
<b>*NICOSH</b> , O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	1,0 L	Po 12-18	60 dni
<b>OSORNO</b> navadna kostreba in nekat. E. Š. pl.	mezotrion	SC	1,5 L	Po 12-18	ČU
<b>PEAK 75 WG</b> E. in nekat. Večl. Š. pl.	prosulfuron	WG	20 g	Po do 17 + M	ČU
<b>*PRIMERO</b> , O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	1,0 L	Po 12-18	ČU
<b>*PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC</b> E. O. in Š. pl.	S-metolaklor + terbutilazin	SC	4,0 - 4,5 L solo	Preem izven VVO Po - glede na razvoj O. plevelov	ČU, le 1x vsako tretje leto, v kombinaciji s FFS na osnovi <i>mezotriona</i> so odmerki nižji!
<b>*RIM 25 WG</b> nekat. vrste E. in Večl. Š. in O. pl.	rimsulfuron	WG	60 g	Po 11-17 + M	ČU, ne za semensko koruzo!
<b>*RIMURON 25 WG</b> , nekat. vrste E. O. in Š. ter Večl. O. pl.	rimsulfuron	WG	50 g ali deljena aplikacija 30 g + 20 g	Po 12-16 + M	ČU
<b>*RINCON 25 SG</b> , nekat. vrste O. in Š. pl.	rimsulfuron	SG	60 g	Po 10-18 + M	ČU
<b>*RINIDI WG</b> E.Š. in nekatere vrste O. pl.	dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron	WG	440 g	Po 14-18	ČU
<b>*SAMSON EXTRA 6 OD</b> O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	0,75 L ali deljena aplikacija 0,5 + 0,25 L	Po 12-18	ČU, ne za sladko koruzo!
<b>*SAMSON 4 SC</b> , O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	1,0 L	Po 12-18	ČU, ne za sladko koruzo!
<b>SHARPEN 33 EC</b> , E. O. in Š. pl.	pendimetalin	EC	3,0 - 5,0 L	Preem 00-09	ČU, VPV
<b>SHARPEN PLUS SC</b> , E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	2,5 - 4,0 L	Preem 00-09	ČU, VPV
<b>*SPANDIS</b> E. in Večl. Š. ter O. pl.	dikamba + nikosulfuron + prosulfuron	WG	400 g	Po 12-18 + M	ČU

# Obvestila poljedelcem

Fitofarmaceutsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe korusa BBCH	Karenca in opombe
<b>STARANE FORTE</b> E. in nekat. Večl. Š. pl.	fluroksipir	EC	<b>0,54 L</b>	Po 12-16	ČU, tudi za sladko koruso
<b>STOMP AQUA</b> E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	CS	<b>3,3 L</b>	Preem, Po do 14	ČU
<b>*STRETCH</b> , E. O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	<b>1,0 L</b>	Po 12-18	ČU
<b>*SUCCESSOR 600</b> , O. in Š. pl.	petoksamid	EC	<b>2,0 L</b>	Preem, Po do 14	ČU, VPV
<b>*TALISMAN</b> , E. in nekat. Večl. O. pl. ter E. Š. pl.	nikosulfuron	OD	<b>1,125 L</b>	Po 12-18	ČU
<b>TANDUS 200 EC**</b> Š. pl.	fluroksipir	EC	<b>1,0 L</b>	Po 13-16	KS 63 dni, registriran le za uporabo v silažni korusi! **zaloge v uporabi do 19.10.2022
<b>*TAROT 25 WG</b> O. in Š. pl.	rimsulfuron	WG	<b>40 - 60 g</b>	Po 12-18 + M	KS 63, KZ=ČU, ne uporabljati na kraških in propustnih tleh!
<b>TEMSA SC</b> navadna kostreba in nekat. E. Š. pl.	mezotrion	SC	<b>1,5 L</b>	Po 12-18	ČU

## Legenda:

E. – enoletni, **Večl.** – večletni, **O.** – ozkolistni, **Š.** – širokolistni, **pl.** – pleveli

**Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza korusa (npr. BBCH 13) = razviti trije listi korusa, **Po + M** - uporaba herbicidov po vzniku posevka in plevelov + obvezno dodajanje močila, **ČU**- karenca zagotovljena s časom uporabe,

**F** - formulacija, **KS** - silažna korusa, **KZ** - korusa za zrnje, **VPV**- varnostni pas do voda, **FFS\*\*** zaloge v uporabi do...

**\*FFS** - velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (**VVO1**), pri pridelovalcih v izbranih **KOPOP** ukrepih!

**OPOZORILO: Pred uporabo kateregakoli herbicida pozorno preberite priložena navodila in opravite škropljenje v skladu s predpisanimi navodili!**