
Obvestila poljedelcem

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec

Urednik: Silvo Žveplan, e-pošta uredništva: silvo.zveplan@ihps.si

Uredniški odbor: Silvo Žveplan, Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, Gregor Leskošek



ISSN 1408 - 4783

Letnik 25, št. 10

29. julij 2016

VARSTVO KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet.

Večina poznih sort krompirja je v zaključnih fazah rasti gomoljev in začetku zorenja, zgodnje sorte krompirja so kmetje večinoma že pospravili.

Vremenske razmere zadnjih dni so ugodne za razvoj krompirjeve plesni. Pri opazovanju v zadnjih dneh opazamo tudi močnejši pojav črne listne pegavosti. Za škropljenje krompirišč, kjer se je krompirjeva plesen že pojavila, priporočamo uporabo fungicidov s polsistemskim ali s sistemskim delovanjem: **Acrobat MZ WG** = Forum MZ****, **Antracol combi**, **Electis 75 WG**, **Equation pro**, **Galben M**, **Infinito** (priporočamo za zaključna škropljenja), **Melody duo WG**, **Moximate plus**, **Moximate 725 WG**, **Moximate 725 WP**, **Nautile DG**, **Nautile WP**, **Profilux**, **Ridomil gold MZ Pepite**, ali **Sacron 45 DG** (z obveznim dodatkom kontaktnega fungicida).

V še neokuženih krompiriških imamo na voljo poleg zgoraj naštetih tudi uporabo kontaktnih fungicidov kot so: **Antracol****, **Antracol WG 70****, **bakrovi pripravki****, ***Banko 500 SC****, **Dithane DG neotec** = Mankoz 75 WG****, **Dithane M- 45****, **Enervin**, **Manfil 75 WG**, **Manfil 80 WP**, **Penncozeb 75 DG**, **Pergado MZ** = Gett****, **Pinozeb M-45**, **Polyram DF**, **Ranman top**, **Ranman twinpack**, **Revus**, **Shirlan = Frownicide = Winby**. Bakrove fungicide priporočamo v ekološki pridelavi vso rastno dobo, v integrirani pridelavi pa ob koncu vegetacije ali kot dodatek (1kg/ha) do konca julija fungicidom na osnovi mankozeba, propineba, klorotalonila ali metirama, ali fungicidom Acrobat MZ WG** = Forum MZ**, Shirlan 500 SC in Electis 75 WG.

Fungicidi označeni z dvema zvezdicama za imenom (FFS**) so registrirani tudi za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (*Alternaria solani*). V času pogostih padavin morate biti pozorni na izpiranje kontaktnih fungicidov!

Samo za zatiranje črne listne pegavosti (*Alternaria solani*) v krompirju lahko uporabite tudi pripravka: **Ortiva** ali **Tazer 250 SC**. **Opozarjamo na menjavanje pripravkov in upoštevanje karenc!**

Za fungicid označen z zvezdico tudi pred imenom *FFS (*Banko 500 SC) velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!**

DESIKACIJA - SUŠENJE KROMPIRJEVKE IN PLEVELOV PRED IZKOPOM KROMPIRJA

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet.

Dva tedna pred predvidenim izkopom lahko opravite desikacijo - krompirjevo cimo in plevele lahko poškropite z enim od herbicidov na osnovi (dikvata) **Reglone 200 SL** ali **Dessicash 200 SL**. Oba herbicida, **Reglone 200 SL** in **Dessicash 200 SL**, se uporabljata kot neselektivna herbicida na semenskem in jedilnem krompirju za sušenje (desikacijo) krompirjevke. Sredstvi delujeta na zelene dele rastlin krompirja hitro in že v nekaj dneh posušita krompirjevko in plevel (proti dežju sta odporna že 15 minut po škropljenju). **Reglone 200 SL** se za sušenje krompirjevke jedilnega krompirja uporablja v odmerku od 2,5 L/ha (25 ml na 100 m²), za sušenje krompirjevke semenskega krompirja v odmerku 4 L/ha (40 ml na 100 m²), vedno ob porabi vode 300-400 L/ha (3-4 L na 100 m²), odvisno od bujnosti krompirjevke. V primeru, da je krompirjeva plesen prisotna v nasadu, lahko 14 dni pred izkopom uporabimo kombinacijo Shirlan (0,3-0,4 L/ha) + **Reglone 200 SL** (2,5 L/ha). **Dessicash 200 SL**, se uporablja za sušenje krompirjevke na semenskem in jedilnem krompirju v odmerku 4L/ha (40 ml na 100 m²), vedno ob porabi vode 200-600 L/ha (2-6 L na 100 m²), odvisno od bujnosti krompirjevke. Za oba velja, da škropite v času, ko imajo gomolji zeleno debelino in čvrsto kožico, oziroma 14 dni preden se krompir izkoplje in skladišči. Karenca za Reglone 200 SL in Dessicash 200 SL je 10 dni!

OPOZORILO: Desikacijo je potrebno opraviti v jasnem, suhem in ne prevročem vremenu. Tla ne smejo biti zasičena z vlago.

Na krompiriščih, kjer krompirjevko mehansko kosite, le to čim prej po košnji odstranite z njiv in počakajte z izkopom vsaj 14 dni, da kožica na krompirjevih gomoljih nekoliko otrdi.

Pred uporabo kateregakoli fitofarmaceutskega sredstva skrbno preberite priložena navodila za uporabo in se držite navedenih odmerkov in opozoril glede karenc, varstva voda in čebel!