

Obvestila poljedelcem

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik: Silvo Žveplan, e-pošta uredništva: silvo.zveplan@ihps.si
Uredniški odbor: Silvo Žveplan, Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, Gregor Leskošek



ISSN 1408 - 4783

Letnik 25 , št. 5

5. maj 2016

VARSTVO OLNJIH BUČ PRED PLEVELI

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v oljnih bučah.

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2016, za uporabo v posevkih oljnih buč po setvi pred vznikom oljnih buč in plevelov

| Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela | Aktivna snov | F | Odmerek | Čas uporabe oljna buča BBCH | Karenca in opombe |
|--|--------------|----|----------------|--|---------------------|
| CENTIUM nekateri vrste O. in Š. pl. | klomazon | CS | 0,25 L/ha | Preem | ČU |
| DEVRIKOL 45 FL nekateri vrste E. O. in Š. pl. | napropamid | SC | 2,0 - 2,5 L/ha | Pred setvijo z obvezno inkorporacijo | ČU |
| STOMP AQUA E. O. in nekat. Š. pl. | pendimetalin | CS | 2,9 L/ha | Preem | ČU, manjša uporaba! |
| *SUCCESOR 600 O. in Š. pl. | petoksamid | EC | 2,0 L/ha | Preem | ČU |

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2016, za uporabo v posevkih oljnih buč po vzniku oljnih buč in plevelov

| Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela | Aktivna snov | F | Odmerek | Čas uporabe oljna buča BBCH | Karenca in opombe |
|--|-------------------|----|----------------|--------------------------------|--|
| FUSILADE FORTE E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>) | fluazifop-p-butyl | EC | 0,8 - 1,7 L/ha | Po 12 - 14 | ČU, manjša uporaba! 0,8 L/ha za zatiranje E. O. plevela; 1,3 L/ha za zatiranje Večl. O. plevela (<i>Sorghum halepense</i>), s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero se razreže rizome; 1,5-1,7 L/ha za zatiranje Večl. O. plevela (<i>Cynodon dactylon</i> , <i>Elymus repens</i>) FFS lahko v oljnih bučah uporabljajo samo poklicni pridelovalci! |

Legenda: E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista, **ČU**- karenca zagotovljena s časom uporabe, **INKORPORACIJA** – plitva zadelava v tla

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!

*** za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!**

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

VARSTVO SOJE PRED PLEVELI

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v soji.

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2016, za uporabo v posevkih soje po setvi pred vznikom soje in plevelov

| Fitofarmacevsko sredstvo, zatira plevela | Aktivna snov | F | Odmerek | Čas uporabe soja BBCH | Karenca in opombe |
|--|--------------|----|-----------------------------------|--|--|
| AFALON E. Š. pl. | linuron | SC | 2,0 - 2,1 L/ha | Preem | ČU |
| CENTIUM nekateri vrste O. in Š. pl. | klomazon | CS | 0,25 L/ha | Preem | ČU, manjša uporaba, tretiranje takoj oz. najkasneje 3 dni po setvi |
| *DUAL GOLD 960 EC E. O. in Š. pl. | S-metolaklor | EC | 1,0 - 1,3 L/ha 1,0 L/ha na VVO | Preem | ČU |
| SHARPEN 33 EC E. O. in Š. pl. | pendimetalin | SC | 3,0 - 5,0 L/ha | Preem 00-09 | ČU |
| SHARPEN 40 SC E. O. in Š. pl. | pendimetalin | SC | 2,5 - 4,0 L/ha | Preem 00-09 | ČU |
| STOMP 400 SC** E. O. in nekat. Š. pl. | pendimetalin | SC | 3,5 L/ha | Pred setvijo z inkorporacijo ali Preem | ČU |
| STOMP AQUA E. O. in nekat. Š. pl. | pendimetalin | CS | 2,6 L/ha | Preem | ČU, manjša uporaba |

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2016, za uporabo v posevkih soje po vzniku soje in plevelov

| Fitofarmacevsko sredstvo, zatira plevela | Aktivna snov | F | Odmerek | Čas uporabe soja BBCH | Karenca in opombe |
|--|---------------------|----|--|--|---|
| *BASAGRAN 480, E. in nek. Večl. Š. pl. | bentazon | SL | 1,5- 2,0 L/ha | Po 11-13 | 60 dni, tretiranje pri temperaturah med 10 in 25 °C! |
| *BASAGRAN, E. in nek. Večl. Š. pl. | bentazon | SL | 1,5- 2,0 L/ha | Po 11-13 | 60 dni, tretiranje pri temper. med 10 in 25 °C! |
| FOCUS ULTRA E. in Večl. O. pl. in samosevci žit | cikloksidim | EC | 2,0 L/ha oz. 1,0 L/ha+1,0L/ha močila DASH HC 4,0 L/ha oz. 2,0 L/ha+2,0L/ha močila DASH HC | Po 12-19 Po 12-19 | 56 dni, enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29) večletni oz. pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15) |
| FUSILADE FORTE E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>) | fluazifop-p-butil | EC | 1,2 L/ha | Po, s predhodno medvrstno obdelavo tal | 90 dni |
| HARMONY 50 SX, E. Š. pl. | tifensulfuron-metil | SG | 2 x 7,5 g/ha deljena (split) aplikacija, razmak med tretiranjema naj bo 7-14 dni | Po 10 - 14 | manjša uporaba, SZ = ČU, SZK = 14 dni FFS samo za poklicne pridelovalce soje! |

Legenda: E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza soje (npr. BBCH 12) = razvita dva lista soje, **ČU**- karenca zagotovljena s časom uporabe, **SZ** – soja za zrnje, **SZK**- soja za zeleno krmo, **INKORPORACIJA** – plitva zadelava v tla
Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!

* za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

FFS** zaloge v prodaji do / zaloge v uporabi do...

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

VARSTVO SONČNIC PRED PLEVELI

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v sončnicah.

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2016, za uporabo v posevkih sončnic po setvi pred vznikom sončnic in plevelov

| Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela | Aktivna snov | F | Odmerek | Čas uporabe sončnica BBCH | Karenca in opombe |
|---|---------------|----|---|---|--------------------------|
| AFALON, E. Š. pl. | linuron | SC | 2,0 - 2,1 L/ha | Preem | ČU |
| *DUAL GOLD 960 EC E. O. in Š. pl. | S-metolaklor | EC | 1,0 - 1,3 L/ha izven VVO 1,0 L/ha na VVO | Preem | ČU |
| *RACER 25 –EC**, Š. in nekat. O. pl. | flurokloridon | EC | 2,0 - 4,0 L/ha | Preem | ČU |
| SHARPEN 33 EC E. O. in Š. pl. | pendimetalin | SC | 3,0 - 5,0 L/ha | Preem, ko klični listi prodrejo skozi zemljo na površje 00-10 | ČU |
| SHARPEN 40 SC E. O. in Š. pl. | pendimetalin | SC | 2,5 - 4,0 L/ha | Preem, ko klični listi prodrejo skozi zemljo na površje 00-10 | ČU |
| STOMP 400 SC** E. O. in nekat. Š. pl. | pendimetalin | SC | 5,0 L/ha | Preem z inkorporacijo | ČU |
| STOMP AQUA E. O. in nekat. Š. pl. | pendimetalin | CS | 2,9 L/ha | Preem | ČU, ne inkorporirati! |

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2016, za uporabo v posevkih sončnic po vzniku sončnic in plevelov

| Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela | Aktivna snov | F | Odmerek | Čas uporabe sončnica BBCH | Karenca in opombe |
|--|-------------------|----|--|--|--|
| FOCUS ULTRA E. in Večl. O. pl. in samosevci žit | cikloksidim | EC | 2,0 L/ha oz. 1,0 L/ha+1,0L/ha močila DASH HC 4,0 L/ha oz. 2,0 L/ha+2,0L/ha močila DASH HC | Po 12-19 Po 12-19 | 56 dni, enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29) večletni oz. pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15) |
| FUSILADE FORTE E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>) | fluazifop-p-butil | EC | 0,8 - 2,0 L/ha | Po | 90 dni, 0,8 L/ha za zatiranje E. O. plevela; 1,3 L/ha za zatiranje Večl. O. plevela (<i>Sorghum halepense</i>), s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero se razreže rizome; 1,5-2,0 L/ha za zatiranje Večl. O. plevela (<i>Cynodon dactylon</i> , <i>Elymus repens</i>) |
| QUICK 5 EC E. in Večl. O. pl. | kvizalofop-p-etil | EC | 1 - 1,5 L/ha (muhviči) 2 - 2-5 L/ha (plazeča pirnica) | Po, pleveli od 2 listov do konca razraščanja | ČU |

Legenda:

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza sončnic (npr. BBCH 12) = razvita dva lista sončnice, **Po + M** - uporaba herbicidov po vzniku posevka in plevelov + obvezno dodajanje močila, **ČU** - karenca zagotovljena s časom uporabe, * za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

FFS** zaloge v prodaji do / zaloge v uporabi do...

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN