


---

# Obvestila sadjarjem

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec  
Urednica: Alenka Ferlež Rus, e-pošta uredništva: [alenka.ferlez-rus@ihps.si](mailto:alenka.ferlez-rus@ihps.si)  
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek  
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €



ISSN 1408 - 4791

Letnik 25, št. 13

1. junij 2016

---

## Varstvo koščičastih sadnih vrst

### Češnjeva muha

V fenološko fazo zorenja, so vstopile zgodnje sorte češenj. Zato je zdaj čas, da na češnje, ki kasneje zorijo, obesite rumene lepljive plošče, za spremljanje pojava češnjeve muhe. Na območju Celjske in Koroške regije smo prve ulove muh na rumenih lepljivih ploščah zabeležili v zadnjih dneh maja. Prag škodljivosti je presežen, če ulovimo eno muho na dve postavljeni plošči od faze, ko češnje spreminjajo barvo iz zelene v rumeno. V nasadih, kjer vam pozeba ni pobrala pridelka ob preseganju praga škodljivosti opravite škropljenje z enim od insekticidov kot sta **Mospilan 20 SG** (0,375 kg/ha) ali **Spada 200 EC** (2,5 L/ha), ki imata 14 dni karence.

**PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRIBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!**

Prav tako lahko za zatiranje češnjeve muhe uporabite biološki pripravek na osnovi glive *Beauveria bassiana* **Naturalis** (2 L/ha), ki nima karence. Vendar morete opraviti vsaj tri tretiranja v časovnem razmiku 5 do 7 dni.

Pri zgodnjih sortah češenj muhe ni potrebno zatirati.

Tudi na vrtovih NE svetujemo zatiranja češnjeve muhe z insekticidi. V vrtovih svetujemo, da obesite rumene lepljive plošče na katere se lovi češnjeva muha. Obesite 10 plošč na drevo (na zahodno in južno stran krošnje). Po končanem obiranju plošče odstranite.

### Plodova vinska mušica

Plodova vinska mušica (*Drosophila suzukii*) je škodljivec plodov številnih sadnih vrst, ki imajo tanko kožico in mehko meso, to so predvsem jagodičevje (jagode, maline, robide, ribez, borovnice, bezeg), koščičarji (češnje, marelice, breskve, slive in češplje) ter tudi grozdje, smokve in plodovi različnih samoniklih rastlin. Plodove napada v času zorenja do obiranja in lahko povzroči znatno škodo, zlasti v času deževnega vremena. Za razliko od drugih vrst vinskih mušic, plodova vinska mušica napada tudi povsem zdrave plodove. V Sloveniji je v preteklosti že povzročila precej škode na češnjah in breskvah.

Natančna navodila za spremljanje in obvladovanje so dostopna na naši spletni strani <http://www.ihps.si/> pod splošna obvestila in spletnih straneh Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin <http://www.uvhvvr.gov.si/si/> ter Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica <http://www.kmetijskizavod-ng.si>.