


# Obvestila sadjarjem

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec  
Urednica: Alenka Ferlež Rus, e-pošta uredništva: [alenka.ferlez-rus@ihps.si](mailto:alenka.ferlez-rus@ihps.si)  
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek  
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €



ISSN 1408 - 4791

Letnik 25 , št. 9

25. april 2016

## VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

### Fenološki razvoj jablan in hrušk

Na območju Celjske regije jablane povprečno na opazovane lokacije in sorte **zaključujejo fenološko fazo intenzivnega odpadanja venčnih listov G (BBCH 67) in prehajajo v fazo konca cvetenja H (BBCH 69)**. Zgodaj cvetoče sorte jablan kot je Idared in hruške že prehaja v fazo, ko so posamezni plodiči večji od 10 mm (BBCH 71).

Na območju Koroške pa jablane intenzivnih nasadov jablan vstopajo v fazo odpadanja venčnih listov.

### Škrlup in pepelasta plesen jablan

Na območju Celjske in Koroške regije je na sadjarskih lokacijah 24. aprila padlo od 0,8 mm (Črnova) do 12 mm (Kasaze) dežja. Izpolnjeni so bili pogoji za lahko okužbo.

Vremenoslovci v nadaljevanju tega tedna napovedujejo hladno in nestanovitno vreme s možnostjo pogostih padavin. Nadaljujte s preventivno zaščito listne mase pred škrlupom z enim od kontaktnih fungicidov kot so: **Delan 700 WG** (0,75 kg/ha), **Dithane DG Neotic** (2 kg /ha), **Dithane M-45** (2 kg/ha), **Manfil 75 WG** (2 kg/ha), **Manfil 80 WG** (2 kga/ha), **Mankoz 75 WG** (2kga/ha), **Penncozeb 75 DG** (2,5 kg/ha), **Pinozeb M – 45** (2 kg/ha) ali **Polyram DF** (2 kg/ha).

V primeru daljšega obdobja omočenja listne mase bodo razmere za izbruhe askospor zelo ugodne, zato pazite na razmike med škropljenji in v primeru, ko pade nad 20 mm dežja škropljenje ponovite. V primeru kratkotrajnih padavin, takoj po dežju (v roku 24 ur), opravite škropljenje s kontaktnim fungicidom **Delan 700 WG** (0,75 kg/ha), ki ima daljše kurativno delovanje.

Uporaba sistemskih pripravkov je smiselna samo v primeru, da bodo od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) in več deževni dnevi in bo padlo več kot 20 mm dežja. V takšnem primeru pa po padavinah opravite kurativno škropljenje z enim od sistemskih pripravkov iz skupine IBE fungicidov kot so: **Score 250 EC** (0,2 L/ha), **Difo 25% EC** (0,2 L/ha) ali **Indar 5 EW** (0,9 L/ha) v kombinaciji s kontaktnim fungicidom **Delan 700 WG** (0,75 kg/ha).

V naslednjih dneh, vremenoslovci napovedujejo zelo nizke temperature, zato dodajanje enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: **Cosan**, **Pepelin**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG**, poroti pepelasti plesni ni smiselno.

V primeru, da ste imeli v preteklem letu v nasadu močnejši pojav jablanove pepelovke, uporabite naslednje pripravke: **Luna experience** (0,75 L/ha), **Stroby WG** (150 g/ha), **Flint** (100 – 150 g/ha), **Zato 50 WG** (100-150 g/ha) ali **Tercel** (2,5 kg/ha).

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.

### Jabolčni zavijač

Ulovi metuljčkov na feromonskih vabah so trenutno na večina lokacijah maloštevilni. Nizke, predvsem večerne in jutranje temperature so upočasnile izleganje metuljčkov in preprečujejo parjenje ter odlaganje jajčec. O optimalnem času zatiranja vas bomo pravočasno obvestili.

### Jabolčna grizlica

Ulovi jabolčne grizlice na belih lepljivih ploščah so bili v času cvetenja jablan na opazovanih lokacijah zelo različni. Na posameznih lokacijah so presegli tudi prag škodljivosti (30 osic/ploščo). V kolikor je prag škodljivosti presežen, oziroma ste imeli v preteklem letu težave z obvladovanjem omenjene škodljivke in v kolikor še niste, po končanem cvetenju opravite škropljenje z enim od pripravkov kot so: **Mospilan SG, 20 SG** (0,04 %), **Moksycan 20 SG** (0,04 %), **Calypso SC 480** (0,3 L/ha) ali **Actara 25 WG** (200 g/ha).

Vsi omenjeni pripravki dobro delujejo tudi na **listne uši**.

**VSE NAŠTETE INSEKTICIDE LAHKO UPORABITE SAMO, KO JE CVETENJE JABLAN POPOLNOMA ZAKLJUČENO!**

Po končanem cvetenju jablan bele lepljive plošče odstranite iz nasadov, saj se na njih lovijo tudi naravni sovražniki (polonice, tančičarice) in čebele.

### **Hrušev ožig**

Cvetenje v intenzivnih nasadih hrušk in jablan se zaključuje. Cvetijo le še travniški nasadi jablan starih sort. Glede na napoved nizkih temperatur, v naslednjih dneh v nasadih, ki še cvetijo ne bo pogojev za cvetne okužbe z bakterijo hruševega ožiga.