

Sočasna uporaba FFS v hmelju in fižolu za leto 2026 (12. 2. 2026)

V preglednici 1 so navedena fitofarmaceutska sredstva katera lahko uporabljate v hmeljiščih, kjer sočasno gojite hmelj in fižol, namreč navedena sredstva imajo uradno dovoljenje tako za hmelj, kot tudi za fižol. Pri njihovi uporabi pa morate dosledno upoštevati odmerek oziroma konc. sredstev, ki so navedena v preglednici 1, namreč v nekaterih primerih se razlikujejo od odmerkov dovoljenih pri hmelju!

Preglednica 1: Registrirana fitofarmaceutska sredstva v letu 2026, katere je mogoče uporabiti ob sočasnem gojenju hmelja in fižola

Rastlina	Bolezni in škodljivci na hmelju/ bolezni in škodljivci na fižolu	Pripravek (aktivna snov)	Odmerek / koncentracija	Karenca	Maks. št. uporab v rastni dobi
HMELJ / FIŽOL	hmeljeva peronospora- sekundarna okužba/ grahova plesen	Cuprblau Z 35 WP (Cu – oksiklorid)	1,5 kg/ha	14 dni hmelj/ 3 dni fižol	2-krat
HMELJ / FIŽOL	hmeljeva peronospora- sekundarna okužba/ fižolov ožig- vdrta fižolova pegavost, fižolova rja	Mirador 250 SC (azoksistrobin)	1,0 l/ha	28 dni hmelj/ 14 dni fižol	2-krat
HMELJ / FIŽOL	hmeljeva peronospora- sekundarna okužba/ fižolov ožig- vdrta fižolova pegavost, fižolova rja	Ortiva (azoksistrobin)	1,0 l/ha	28 dni hmelj/ 14 dni fižol	2-krat
HMELJ / FIŽOL	hmeljeva peronospora- sekundarna okužba/ fižolov ožig- vdrta fižolova pegavost, fižolova rja	Zaftra AZT 250 SC (azoksistrobin)	1,0 l/ha	28 dni hmelj/ 14 dni fižol	2-krat
HMELJ / FIŽOL	hmeljeva listna uš, hmeljev bolhač, koruzna vešča/ listne uši	Karate Zeon 5 CS (lambda-cihalotrin)	0,15 l/ha	21 dni hmelj/ 7 dni fižol	2-krat
HMELJ / FIŽOL	koruzna vešča/ bombaževa sovka, južna plodovrta, pesna sovka	Lepinox plus (<i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i>)	1,0 kg/ha	6 dni za hmelj/ 1 dan za fižol	3-krat
HMELJ / FIŽOL	koruzna vešča/ gosenice metuljev (Lepidoptera)	Agree WG (<i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>Aizawai</i>)	1,0 kg/ha	ni potrebna	3-krat

V hmeljiščih, kjer sočasno gojite prvoletni hmelj, ki ga ne boste obirali, in fižol, je dovoljena uporaba herbicida Stomp aqua.

Preglednica 2: Uporaba herbicida v prvoletnem nasadu hmelja, kjer se sočasno goji poleg tudi fižol

Pripravek	Aktivna snov	Odmerek	Karenca (dni)	Maks. št. škropljenj v rastni dobi
Stomp Aqua	pendimetalin	2,9 l/ha*/ (1,0 l/ha)	zagotovljena s časom uporabe	1-krat

*Škropimo le v pasovih, zato moramo odmerke/ha preračunati na dejansko poškrpljeno površino!