


Obvestila vinogradnikom

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednica: Alenka Ferlež Rus, e-pošta uredništva: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, Silvo Žveplan



ISSN 1408 - 4805

Letnik 22, št. 7

8. junij 2016

Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline sorta Chardonnay vstopa v fazo začetka cvetenja BBCH 60 – 61. Glavnina sort pa je v fenološki fazi BBCH 57, ko so socvetja popolnoma razvita in cvetovi ločeni. V razvoju najbolj zaostajata sorti Laški rizling in Šipon, ki zaključujeta fenološko fazo BBCH 55 in prehajata v fazo BBCH 57.

Peronospora in oidij vinske trte

Glede na fenološko fazo vinske trte, ki prehaja v fazo cvetenja, ko je vinska trta občutljiva na okužbe, bo v primeru pogostih ploh in neviht nevarnost za okužbe s peronosporo velika. Škropljenje proti peronospori še vedno lahko opravite s pripravki, ki smo jih svetovali uporabiti v obvestilu št. 6: **Antracol combi** (2 kg/ha), **Curzate M** (2 – 3 kg/ha), **Equation pro** (0,4 kg/ha), **Moximate 725 WG** ali **WP** (1,25 kg/ha), **Moximate plus** (1,25 kg/ha), **Profilux** (1,25 kg/ha), **Nautil DG** (2,4 kg/ha), **Enervin** (2,5 kg/ha), **Electis 75 WG** (1,5 – 1,8 kg/ha), **Emendo F** (1,5 kg/ha), **Valis F** (1,5 kg/ha), **Ridomil Gold combi Pepite** (2 kg/ha) ali **Ridomil Gold MZ Pepite** (2,5 kg/ha).

Glede na nadaljevanje toplega vremena v naslednjih dneh pričakujemo začetek cvetenja glavnine sort. Zato pri škropljenju proti peronospori priporočamo dati prednost kombiniranim, sistemsko ali polsistemsko delujočim pripravkom kot so: **Forum star** (1,6 kg/ha), **Sfinga Extra WDG** (1,5 kg/ha), **Forum MZ WG** (2,5 kg/ha), **Acrobat MZ** (2,5 kg/ha), **Fantic F** (2 kg/ha), **Galben M** (2,5 kg/ha), **Mildicut** (2 L/ha) ali **Orvego** (0,8 L/ha).

V času, ko bo vinska trta prešla v fazo polnega cvetenja (BBCH 65), pa dajte prednost pripravkom kot so: **Alleato 80 WG** (2,5 kg/ha), **Mikal flash** (4 kg/ha), **Momentum F** (4kg/ha), **Mikal premium F** (3 kg/ha), **Momentum trio** (3kg/ha), **Melody combi WG 65,3** (1,5 kg/ha) ali **Melody duo WP 66,8** (2 – 2,5kg/ha).

Pripravkoma **Equation pro** in **Alleato 80 WG** priporočamo dodati polovični odmerek enega od kontaktnih fungicidov.

Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 do 10 dni.

Trenutne vremenske razmere ustvarjajo ugodne pogoje za pojav oidija na vinski trti. Zato v vinogradih, kjer ste v preteklem letu imeli težave z obvladovanjem oidija bodite še posebej pozorni. V vinogradih, kjer je v lanskem letu prišlo do močnejših okužb z oidijem, priporočamo dodati pripravek **Karathane Gold 350 EC** (0,5L/ha) ali kombiniran pripravek **Falcon EC 460** (0,3 do 0,4 L/ha) ali pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: **Folicur EW 250** (0,4 L/ha), **Orius 25 EW** (0,4 L/ha), **Mystic 250 EC** (0,4 L/ha.) ali **Tebusha 25%EW** (0,4 L/ha).

Namesto naštetih pripravkov lahko v času prehoda vinske trte v fazo cvetenja uporabite naslednje pripravke: **Crystal** (0,16 L/ha), **Collis** (0,4 L/ha), **Luna Experience** (0,375 L/ha), **Kusabi 300 SC** (0,15 L/ha), **Stroby WG** (0,1 – 0,2 kg/ha), **Misha 20 EW** (0,23 L/ha), **Domark 100 EC** (0,3 L/ha), **Topas 100 EC** (3L/ha) ali **Topaze** (3L/ha).

Uporabite lahko tudi pripravek **Cabrio Top** (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte.

Pripravkom za zatiranje oidija lahko dodajte še pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: **Cosan**, **Kumuluf DF**, **Microthiol special**, **Pepelin**, **Thiovit Jet** ali **Vindex 80 WG**, v odmerku 3 do 8 kg/ha ali **Pol-Sulphur 80 WG**, **WP** v odmerku 4 kg/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi **Cosinus**, **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** v odmerku do 8 kg/ha.

V primeru **toče** takoj opravite škropljenje s pripravkom **Folpan 80 WDG** ali **Folpan 50 SC** oziroma drugimi pripravki, ki vsebujejo aktivno snov folpet (Forum star, Sfinga Exstra WDG, Emendo F, Valis F, Fantic F, Momentum trio, Momentum F, Mikal flash, Mikal premium, Melody combi WG 65,3 ali Ridomil Gold combi Pepite).

Grozdni sukači

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline se let prve generacije grozdnih sukačev zaključuje. Pri pregledu grozdičev na lokacijah, kjer smo imeli številčnejše love križastega grozdnega sukača (ožji okoliš Konjice), trenutno najdemo od 25 do 40 zapredkov na 100 pregledanih grozdičev, kar je pod pragom gospodarske škode, (prag za prvi rod: 100 in več zapredkov na 100 pregledanih grozdičev). V teh vinogradih bo potrebno zatiranju drugega rodu križastih sukačev nameniti posebno pozornost, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Ameriški škržatek

Prve ličike ameriški škržatek, ki je prenašalec zlate tresne rumenice smo našli 26. maja. Trenutno prevladujejo ličinke prvega L_1 razvojnega stadija, najdemo pa tudi posmezne ličinke drugega L_2 razvojnega stadija. O zatiranju in uporabi primernih insekticidov vas bomo pravočasno obvestili.