

# Vrtnarska obvestila

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec  
Urednik: Silvo Žveplan, e-pošta uredništva: [silvo.zveplan@ihps.si](mailto:silvo.zveplan@ihps.si)  
Uredniški odbor: Silvo Žveplan, dr. Magda Rak Cizej, Alenka Ferlež Rus, dr. Sebastjan Radišek  
Naklada: 20 izvodov. Letna naročnina 20,20 €



ISSN 1408 - 4783

Letnik 4, št. 6

31. avgust 2016

Silvo Žveplan

## VARSTVO KAPUSNIC PRED ŠKODLJIVCI

### Kapusov molj

V zadnjih dneh ponovno opažamo v nasadih kapusnic večjo prisotnost kapusovega molja (*Plutella xylostella*). V primeru preseženega praga škodljivosti (1 gosenica/rastlino) priporočamo uporabo enega od sledečih insekticidov: **Affirm** (1,5 kg/ha; zelje, cvetača, brokoli; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni), **Decis 100 EC** (75 ml/ha; brstični ohrovt, cvetača, zelje; največ 1-krat v eni rastni dobi; K = 7 dni), **Fastac 100 EC** (0,1 L/ha; brokoli, brstični ohrovt, zelje, ohrovt; največ 2-krat v eni rastni dobi; K = 14 dni), **Karate Zeon 5 CS** (0,15 L/ha; brstični ohrovt, zelje, kitajsko zelje, cvetača; kitajsko zelje največ 1-krat v eni rastni sezoni; brstični ohrovt, zelje, cvetača največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni za kitajsko zelje in cvetačo ter K = 21 dni za zelje, brstični ohrovt), **Lepinox plus** (1 kg/ha; brstični ohrovt, brokoli, ohrovt, zelje, kitajsko zelje; K ni potrebna), **Mimic** (0,3 - 0,4 L/ha; kapusnice; uporaba največ 1-krat letno; K = 14 dni), **Neemazal-T/S** (3L/ha; zelje, ohrovt, brstični ohrovt; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni), **Steward** (85 g/ha; brokoli, brstični ohrovt, cvetača, zelje, rdeče zelje; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni, za brstični ohrovt K = 28 dni). Affirm, Mimic, Neemazal – T/S, Karate zeon in Steward zatirajo tudi kapusovo sovko.

**LEGENDA: K = karenca. Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in ob škropljenju upoštevajte vse zakonske predpise o varovanju čebel, upoštevajte predpisane varnostne pasove do voda in karenčne dobe!**

### Belini

Na opazovanih lokacijah beležimo močnejši pojav metuljev kapusovega belina (*Pieris brassicae*) oz. repnega belina (*Pieris rapae*). Pridelovalce kapusnic opozarjamo, da pregledajo svoje nasade in ob pojavu gosenic belinov uporabijo enega od insekticidov: **Affirm** (1,5 kg/ha; zelje, cvetača, brokoli; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni), **Bulldock EC 25** (0,3-0,5 L/ha; zelje, kitajsko zelje, ohrovt; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), **Decis 100 EC** 75 ml/ha (zelje, brstični ohrovt, cvetača; največ 1-krat v eni rastni dobi; K = 7 dni), **Delfin WG** (0,075 %; zelje, ohrovt, cvetača; uporaba največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = ni potrebna), **Fastac 100 EC** (0,1 L/ha; brokoli, brstični ohrovt, zelje, ohrovt; uporaba največ 2-krat v eni rastni dobi; K = 14 dni), **Karate Zeon 5 CS** (0,2 L/ha za brstični ohrovt in zelje ter odmerek 0,15 L/ha za kitajsko zelje in cvetačo; kitajsko zelje največ 1-krat v eni rastni sezoni; brstični ohrovt, zelje, cvetača največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni za kitajsko zelje in cvetačo ter K = 21 dni za zelje in brstični ohrovt), **Karis 10 CS** (50 ml/ha; brstični ohrovt, zelje, cvetača, ohrovt, brokoli; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = zagotovljena s časom uporabe), **Mimic** (0,3-0,4 L/ha; kapusnice; uporaba 1-krat letno; K = 14 dni), **Neemazal – T/S** (3 L/ha; zelje, ohrovt, brstični ohrovt; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni), **Steward** (85 g/ha; brokoli, brstični ohrovt, cvetača, zelje, rdeče zelje; uporaba največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni, za brstični ohrovt K = 28 dni). **Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in ob škropljenju upoštevajte vse ukrepe za varovanje čebel in voda, kateri so navedeni v navodilih za uporabo FFS!**

## **VARSTVO FIŽOLA PRED BOLEZNIMI**

### **Fižolov ožig**

V zadnjih dneh smo na opazovanih lokacijah beležili povečan pojav fižolovega ožiga (*Colletotrichum lindemuthianum*) na strokih fižola. Pridelovalce fižola opozarjamo, da pregledajo svoje nasade fižola in ob pojavu fižolovega ožiga uporabijo enega od fungicidov: **Cuprablau Z 50 WP** (je preventivni kontaktni fungicid; odmerek 0,8-1,5 kg/ha; največ 3-krat v eni rastni sezoni; K = 3 dni), **Ortiva** (sistemični fungicid; odmerek 1-2 L/ha – odmerek je odvisen od višine škropljenih rastlin; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni) ali **Switch 62,5** (ima kombinirano kontaktno in sistemsko delovanje; deluje na fižolov ožig in tudi na listno pegavost na fižolu (odmerek 1 kg/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 28 dni za stročnice za zrnje, K = 14 dni za ostale stročnice). **Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno upoštevajte!**

### **Fižolova rja**

V zadnjih dneh beležimo močnejši pojav fižolove rje (*Uromyces appendiculatus*). Bolezenske znake opazamo tako na listih kot tudi na strokih fižola. Pridelovalcem fižola svetujemo varstvo fižola z enim od fungicidov: **Ortiva**, 1-2 L/ha; K = 7 dni; dovoljena uporaba največ 2-krat v eni rastni sezoni ali **Signum** 1 kg/ha; K = 21 dni, dovoljena uporaba največ 2-krat v eni rastni sezoni; delno zatira tudi sivo plesen (*Botrytis* spp.).

**Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno upoštevajte!**

---