

Magda Rak Cizej: Seznam FFS registriranih v hmelju in fižolu

V preglednici so navedena fitofarmacevtska sredstva katera lahko uporabljate v hmeljiščih, kjer sočasno gojite hmelj in fižol, namreč navedena sredstva imajo uradno dovoljenje tako za hmelj, kot tudi fižol, pri čemer morate dosledno upoštevati odmerek oziroma konc. sredstev, ki so navedena v preglednici.

Preglednica: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v letu 2019, katere je mogoče uporabiti ob sočasnem gojenju hmelja in fižola

Rastlina	Bolezen/škodljivec	Pripravek (aktivna snov)	Odmerek/koncentracija	Karenca	Maks. št. uporab v rastni dobi
HMELJ/ FIŽOL	hmeljeva peronospora- sekundarna okužba/ grahova plesen	Champ Formula 2 FLO* (Cu – hidroksid)	0,20-0,25 % (2,8 l/ha)	hmelj 14 dni/ fižol 3 dni	2-krat
		Champion 50 WG* (Cu – hidroksid)	2,0 kg/ha		
		Cuprblau Z 35 WP (Cu – oksiklorid)	1,5 kg/ha		
HMELJ/ FIŽOL	hmeljeva peronospora- sekundarna okužba/ bela gniloba, fižolov ožig-vdrta fižolova pegavost, fižolova rja	Ortiva (azoksistrobin)	1,0 l/ha	hmelj 28 dni/ fižol 7 dni	2-krat
		Zaftra AZT 250 SC (azoksistrobin)	1,0 l/ha		
HMELJ/ FIŽOL	hmeljeva listna uš, hmeljev bolhač, koruzna vešča/ listne uši	Karate Zeon 5 CS (lambda-cihalotrin)	0,15 l/ha	hmelj 21 dni/ fižol 7 dni	2-krat
HMELJ/ FIŽOL	koruzna vešča/ bombaževčeva sovka, južna plodovrtka, pesna sovka	Lepinox plus (<i>Bacillus</i> <i>Thuringhiensis</i> var. <i>Kurstaki</i>)	1,0 kg	ni potrebna	3-krat

*Uporaba zalog s staro etiketo, na kateri je navedena uporaba za hmelj in sicer do 31.5.2019.

V hmeljišču, kjer sočasno gojite prvoletni hmelj, ki ga ne boste obirali, in fižol je dovoljena uporaba herbicida Stomp aqua

Pripravek	Aktivna snov	Odmerek	Karenca (dni)	Maksimalno število škropljenj v rastni dobi
Stomp Aqua	pendimetalin	2,9 l/ha*	zagotovljena s časom uporabe	1-krat

* Škropimo le v pasovih, zato moramo odmerke/ha preračunati na dejansko poškrpljeno površino!