

Magda Rak Cizej: Seznam FFS registriranih v hmelju in fižolu v letu 2021

V preglednici so navedena fitofarmacevtska sredstva katera lahko uporabljate v hmeljiščih, kjer sočasno gojite hmelj in fižol, namreč navedena sredstva imajo uradno dovoljenje tako za hmelj, kot tudi za fižol. Pri njihovi uporabi pa morate dosledno upoštevati odmerek oziroma konc. sredstev, ki so navedena v preglednici kajti v nekaterih primerih se razlikujejo od odmerkov dovoljenih v hmelju!

Preglednica: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v letu 2021, katere je mogoče uporabiti ob sočasnem gojenju hmelja in fižola

Rastlina	Bolezen/škodljivec	Pripravek (aktivna snov)	Odmerek/koncentracija	Karenca	Maks. št. uporab v rastni dobi
HMELJ/ FIŽOL	hmeljeva peronospora- sekundarna okužba/ grahova plesen	Cuprblau Z 35 WP (Cu – oksiklorid)	1,5 kg/ha	hmelj 14 dni/ fižol 3 dni	2-krat
HMELJ/ FIŽOL	hmeljeva peronospora- sekundarna okužba/ bela gniloba, fižolov ožig-vdrta fižolova pegavost, fižolova rja	Mirador 250 SC (azoksistrobin)	1,0 l/ha	hmelj 28 dni/ fižol 7 dni	2-krat
		Ortiva (azoksistrobin)	1,0 l/ha		
		Zaftra AZT 250 SC (azoksistrobin)	1,0 l/ha		
HMELJ/ FIŽOL	hmeljeva listna uš, hmeljev bolhač, koruzna vešča/ listne uši	Karate Zeon 5 CS (lambda-cihalotrin)	0,15 l/ha	hmelj 21 dni/ fižol 7 dni	2-krat

V hmeljišču, kjer sočasno gojite prvoletni hmelj, ki ga ne boste obirali in fižol, je dovoljena uporaba herbicida Stomp aqua

Pripravek	Aktivna snov	Odmerek	Karenca (dni)	Maksimalno število škropljenj v rastni dobi
Stomp Aqua	pendimetalin	2,9 l/ha*	zagotovljena s časom uporabe	1-krat

* Škropimo le v pasovih, zato moramo odmerke/ha preračunati na dejansko poškrpljeno površino!