

Obvestila poljedelcem

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik: Silvo Žveplan, e-pošta uredništva: silvo.zveplan@ihps.si
Uredniški odbor: Silvo Žveplan, Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, Gregor Leskošek



ISSN 2536 - 2321 (za spletno izdajo)

Letnik 30, št. 5

28. april 2021

VARSTVO OLNJIH BUČ, BUČ PRED PLEVELI

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v oljnih bučah, bučah

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2021, za uporabo v posevkih oljnih buč, buč po setvi pred vznikom oljnih buč, buč in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe oljna buča, buča BBCH	Karenca in opombe
CENTIUM 36 CS, COMMAND 36 CS**, DR METROB KLOMAZON** nekatero vrste O. in Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L/ha	Preem	ČU **zaloge v uporabi do 30.4.2021
CLOMATE nekatero vrste E. Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L/ha	Preem	ČU, manjša uporaba!
DEVRIKOL 45 FL nekatero vrste E. O. in Š. pl.	napropamid	SC	2,0-2,5 L/ha	Pred setvijo s plitvo vdelavo na globino 2-5 cm (inkorporacija)	ČU, manjša uporaba!
*SUCCESSOR 600 O. in Š. pl.	petoksamid	EC	2,0 L/ha	Preem	ČU, buča

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2021, za uporabo v posevkih oljnih buč, buč po vzniku oljnih buč, buč in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe oljna buča, buča BBCH	Karenca in opombe
FUSILADE FORTE E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)	fluazifop-p-butil	EC	0,8 - 1,3 L/ha	Po 12 - 14	ČU, manjša uporaba! 0,8 L/ha za zatiranje E. O. plevela; 1,3 L/ha za zatiranje Večl. O. plevela (<i>Sorghum halepense</i>), s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero se razreže rizome.
FUSILADE MAX E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)	fluazifop-p-butil	EC	1,0 - 1,5 L/ha	Po 12 - 14	ČU, manjša uporaba! 1,0 L/ha za zatiranje E. O. plevela; 1,5 L/ha za zatiranje Večl. O. plevela (<i>Sorghum halepense</i>), s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero se razreže rizome.

Legenda: E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista buč, **ČU** - karenca zagotovljena s časom uporabe, **FFS**** zaloge v uporabi do...

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!

*FFS-velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepah!!!

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

VARSTVO SOJE PRED PLEVELI

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v soji.

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2021, za uporabo v posevkih soje po setvi pred vznikom soje in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe soja BBCH	Karenca in opombe
CENTIUM 36 CS, COMMAND 36 CS**, DR METROB KLOMAZON**, nekatero vrsto O. in Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L/ha	Preem	ČU, manjša uporaba, tretiranje takoj oz. najkasneje 3 dni po setvi, **zaloge v uporabi do 30.4.2021
CLOMATE nekatero vrsto E. Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L/ha	Preem	ČU, manjša uporaba!
*DUAL GOLD 960 EC E. O. in Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L/ha 1,0 L/ha na VVO	Preem	ČU
*EFICA 960 EC E. O. in nekatero vrsto Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L/ha 1,0 L/ha na VVO	Preem	ČU
SHARPEN 33 EC E. O. in Š. pl.	pendimetalin	EC	3,0 - 5,0 L/ha	Preem 00-09	ČU
SHARPEN PLUS E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	2,5 - 4,0 L/ha	Preem 00-09	ČU, (staro ime: SHARPEN 40 SC)
STOMP AQUA E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	CS	2,6 L/ha	Preem	ČU, manjša uporaba

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2021, za uporabo v posevkih soje po vzniku soje in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe soja BBCH	Karenca in opombe
*BASAGRAN 480 E. in nek. Večl. Š. pl.	bentazon	SL	1,5- 2,0 L/ha	Po 11-13	60 dni, tretiranje pri temperaturah do 25 °C!
FOCUS ULTRA E. in Večl. O. pl. in samosevci žit	cikloksidim	EC	2,0 L/ha oz. 1,0 L/ha+1,0L/ha močila DASH HC 4,0 L/ha oz. 2,0 L/ha+2,0L/ha močila DASH HC	Po 12-19 Po 12-19	56 dni, enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29) večletni oz. pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)
HARMONY 50 SX E. Š. pl.	tifensulfuron-metil	SG	2 x 7,5 g/ha deljena (split) aplikacija, razmak med tretiranjema naj bo 7-14 dni	Po 10-14	manjša uporaba, SZ = ČU, SZK = 14 dni
WISH TOP nekatero vrsto E. in Večl. O. pl.	kvizalofop-p-etil	EC	0,9 L/ha	Po 12-18	ČU

Legenda: SZ – soja za zrnje, SZK- soja za zeleno krmo,

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista soje, ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!

*FFS - velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

FFS** zaloge v uporabi do...

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

VARSTVO SONČNIC PRED PLEVELI

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v sončnicah.

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2021, za uporabo v posevkih sončnic po setvi pred vznikom sončnic in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe sončnica BBCH	Karenca in opombe
CHALLENGE Š. in O. pl.	aklonifen	SC	4,0 L/ha	Preem 00-08	90 dni
CHANON nekatero vrsto O. in Š. pl.	aklonifen	SC	3,0 L/ha	Preem	ČU
CREDIT XTREME E. in Večl. O. in Š. pl.	glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli	SL	1,33 – 4,0 L/ha ali 1,2-2,0 L/ha	predsetvena priprava tal, pred setvijo, Preem - po setvi	ČU
*DUAL GOLD 960 EC E. O. in Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L/ha izven VVO 1,0 L/ha na VVO	Preem	ČU
*EFICA 960 EC E. O. in nekatere vrste Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L/ha 1,0 L/ha na VVO	Preem	ČU
SHARPEN 33 EC , E. O. in Š. pl.	pendimetalin	EC	3,0 - 5,0 L/ha	Preem 00-09	ČU
SHARPEN PLUS , E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	2,5 - 4,0 L/ha	Preem 00-09	ČU, (staro ime: SHARPEN 40 SC)
STOMP AQUA E. O. in nekatere vrste Š. pl.	pendimetalin	CS	2,9 L/ha	Preem	ČU

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2021, za uporabo v posevkih sončnic po vzniku sončnic in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe sončnica BBCH	Karenca in opombe
FOCUS ULTRA E. in Večl. O. pl. in samosevci žit	cikloksidim	EC	2,0 L/ha oz. 1,0 L/ha+1,0L/ha močila DASH HC 4,0 L/ha oz. 2,0 L/ha+2,0L/ha močila DASH HC	Po 12-19 Po 12-19	ČU, enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29) večletni oz. pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)
FUSILADE FORTE E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)	fluazifop-p-butil	EC	0,8 - 2,5 L/ha	Po, do razvitih šest parov listov	90 dni, 0,8-1,7 L/ha za zatiranje E. O. pl. 1,7-2,5 L/ha za zatiranje Večl.O. pl.
FUSILADE MAX E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)	fluazifop-p-butil	EC	1,0 - 3,0 L/ha	Po, do razvitih šest parov listov	90 dni, 1,0-2,0 L/ha za zatiranje E. O. pl. 2,0-3,0 L/ha za zatiranje Večl.O. pl.
QUICK 5 EC E. in Večl. O. pl.	kvizalofop-p-etil	EC	1,0 - 2,0 L/ha	Po	ČU, pleveli od 2 listov do konca razraščanja (BBCH 12-29).
WISH TOP nekatero vrsto E. in Večl. O. pl.	kvizalofop-p-etil	EC	0,9 L/ha	Po 12-18	ČU

Legenda:

E. – enoletni, **Večl.** – večletni, **O.** – ozkolistni, **Š.** – širokolistni, **pl.** – pleveli

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza sončnic (npr. BBCH 12) = razvita dva lista sončnice,

ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,

*** za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!**

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!