

Podatki o publikaciji

Izdaja: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

Urednica: Alenka Ferlež Rus

E-pošta uredništva: alenka.ferlez-rus@ihps.si

Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus in Silvo Žveplan



ISSN 2536-2372 (za spletno izdajo)

Letnik 27, št. 7

22. junij 2021

Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi cvetenja. Sorte, ki so počasnejše v razvoju (Laški rizling, Šipon) so v fazi začetka do zgodnjega cvetenja BBCH 61-63 (10 do 30 % odpadlih cvetnih kopic); sledijo sorte Sauvignon, Modra frankinja, ki so v fenološki fazi BBCH 63; sorte, ki so hitrejšje v razvoju (Chardonnay, Beli Pinot, Rumeni muškat) pa prehajajo v fazo polnega cvetenja BBCH 64-65 (40 do 50 % odpadlih cvetnih kopic).

Oidij in peronospora vinske trte

Vinska trta je še vedno bujno raste, zato poskrbite, da bo listna masa stalno zaščitena. Razmiki med škropljenji naj ne bodo daljši do 10 dni.

Trenutno zelo toplo vreme lahko v primeru visoke nočne in jutranje relativne zračne vlage ustvarja predvsem pogoje za okužbe z **oidijem vinske trte**. Zato škropljenje opravite z enim od naslednjih pripravkov: **Collis** (0,4 L/ha), **Luna Experience** (0,375 L/ha), **Luna max** (1L/ha), **Talendo extra** (0,08 – 0,2 L/ha), **Talendo** (0,25 L/ha), **Vivando** (0,16 L/ha), **Custodia** (0,35 L/ha), **Domark 100 EC** (0,3 L/ha) **Misha 20 EW** (0,23 L/ha), **Sythane 20 EW** (0,14 L/ha), **Karathane Gold 350 EC** (0,5 L/ha), **Kusabi 300 SC** (0,25 L/ha), **Dynali** (0,65 L/ha) **Topas 100 EC** (0,3L/ha), **Topaze** (0,3 L/ha), **Score 250 EC** (0,2 L/ha), **Mavita 250 EC** (0,2 L/ha), **Difcor 250 EC** (0,12 L/ha), **Spirox D** (0,5 L/ha), **Sercadis** (0,15 L/ha), **Unicorn DF** (2,2 kg/ha), **Prosper CS 300** (1L/ha), **Nativo 75 WG** (0,16kg/ha) ali uporabite pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: **Folicur EW 250** (0,4 L/ha), **Orius 25 EW** (0,4 L/ha), **Mystic 250 EC** (0,4 L/ha.), **Tebusha 25%EW** (0,4 L/ha), **Baltazar** (0,4 L/ha) ali **Star Tebukonazol** (0,4 L/ha).

Uporabite lahko tudi pripravek **Cabrio Top** (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte.

Za zmanjševanje okužb proti oidiju lahko uporabite tudi pripravka na osnovi kalijevega hidrogen karbonata kot sta: **Vitisan** (6 kg/ha) ali **Karbicare** (5kg/ha), ki sta registrirana tudi v ekološki pridelavi.

Prav tako lahko dodate pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: **Cosan**, **Kumuluf DF**, **Microthiol special**, **Microthiol disperss**, **Pepelin**, **Thiovit Jet** ali **Vindex 80 WG** - v odmerku 3 do 8 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC**, **Pol- Sulphur 80 WG**, **WP**, **Pol- Sulphur 800 SC**, **Symbiotica fito – granulirano žveplo**, **Symbiotica fito – tekoče žveplo** - v odmerku 4L - kg/ha ali **Azumo WG** v odmerku 4-8 kg/ha ali **Cosavet DF**, **Močljivo žveplo Karsia DF** v odmerku do 3,6-8 kg/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi **Cosinus** v odmerku 8 kg/ha. Ob tako visokih temperaturah zraka (nad 30 °C), škropite izključno zgodaj zjutraj ali pozno zvečer.

Proti peronospori pa dodajte enega od kombiniranih, sistemsko ali polsistemsko delujočih pripravkov kot so: **Forum star** (1,6 kg/ha), **Sfinga Extra WDG** (1,5 kg/ha), **Forum MZ WG** (2,5 kg/ha), **Acrobat MZ** (2,5 kg/ha), **Sanvino** (0,75 kg/ha), **Orvego** (0,8 L/ha), **Mikal flash** (4 kg/ha), **Mikal premium F** (3 kg/ha), **Momentum trio** (3kg/ha) ali **Magma triple WG** (3kg/ha).

Škropljenje lahko opravite tudi s pripravki kot so: **Folpan gold** (2 kg/ha), **Ridomil Gold MZ Pepite** (2,5 kg/ha), **Armel M** (2,5 kg/ha), **Ampexio** (0,5 kg/ha), **Electis 75 WG** (1,5 – 1,8 kg/ha) ali **Reboot** (0,4

Obvestila vinogradnikom

kg/ha).

Ameriški škržatek

V vinogradih trenutno najdemo ličinke L1 in L2 razvojnega stadija. Glede na napoved nadaljevanja zelo toplega vremena, pričakujemo hitro nadaljevanje razvoja ličink. Zato predvidevamo, da bo optimalen čas za zatiranje ameriškega škržatka po končanem cvetenju vinske trte. O natančnih rokih zatiranja in uporabi primernih insekticidov vas bomo pravočasno obvestili.

Toča

V primeru toče dajte pri škropljenju prednost pripravkom, ki vsebujejo aktivno snov folpet kot so: **Forum star, Sfinga Extra WDG, Folpan gold, , Sanvino, Mikal flash, Mikal premium F, Momentum trio** ali **Magma triple WG**.