

**Preimaginalni stadiji in imago ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus* Ball)
dr. Magda Rak Cizej (IHPS) in mag. Gabrijel Seljak (oktober 2022)**




- **Ličinka L1** - povprečna dolžina do 1,5 mm; prozorno bele barve; krilnih nastavkov še ni
- **Ličinka L2** - povprečna dolžina do 2,5 mm; prozorno do slonokoščene bele barve; krilni nastavki še niso opazni
- **Ličinka L3** - povprečna dolžina do 3,5 mm; slonokoščene bele do rumene barve s svetlo sajastimi lisami; začetek oblikovanja krilnih nastavkov




- **Ličinka L4** - povprečna dolžina do 4,5 mm; temnejše lise po oprsju; krilni nastavki sprednjih kril razviti, a segajo le malo čez polovico nastavkov zadnjih kril
- **Ličinka L5** - povprečna dolžina do 5 mm; rumene barve z rjavimi lisami; vrh krilnih nastavkov sprednjih kril sega vse do vrha nastavkov zadnjih kril

Vsi razvojni stadiji ličink s parom črnih peg na bokih 8. tergita.

- **Odrasel ameriški škržatek (imago)** - dolžina samčka (♂) 4,8 – 5,2 mm, samičke (♀) 5,4 do 6,0 mm, okrasto rjav, glava in oprsje svetlejše s prečnimi rjavo oranžnimi pasovi; glava spredaj topokotno oglata z 2-3 značilnimi rdeče rjavimi prečnimi čelnimi črtami na prehodu temena v obrazni del glave; žile sprednjih kril temno rjave, izrazito izstopajo na svetlejši podlagi; dve značilni izstopajoče beli poševni pegi na sredini stičišča obeh sprednjih kril.



Ameriški škržatek, ličinka L5 (Foto: Gabrijel Seljak)



Razvojni krog ameriškega škržatka (Foto: Gabrijel Seljak)