


Podatki o publikaciji

Izdaja: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

Urednica: Alenka Ferlež Rus

E-pošta uredništva: alenka.ferlez-rus@ihps.si

Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek,
Gregor Leskošek



ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)

Letnik 32, št. 1

6. marec 2023

VARSTVO BRESKEV, NEKTARIN IN MARELIC

Na območju Celjske in Koroške regije breskve in nektarine vstopajo v fenološko fazo nabrekanja brstov (listni brsti BBCH 01-03, cvetni brsti BBCH 00-51) in hkrati tudi v občutljivo razvojno fazo za okužbe z **breskovo kodravostjo**. Poleg razvojne faze morata biti za uspešno okužbo izpolnjeni še naslednja pogoja: **temperatur zraka nad 8 °C in dovolj padavin**.

Na lokacijah, kjer so breskve in nektarine že dosegle fenološko fazo konec nabrekanja brsta do odpiranja brsta (listni brsti BBCH 03, cvetni brsti 51 - 53) **opravite tik pred napovednimi padavinami prvo škropljenje proti breskovi kodravosti s pripravki na osnovi bakra**, saj strategija obvladovanja te bolezni temelji na preventivnem pristopu. V primeru nočnih temperaturah pod lediščem, s škropljenjem počakajte in ga opravite po otoplitvi vremena. Škropljenje z bakrovimi pripravki lahko pri temperaturah pod 0 °C povzroča ožige.

Prvo škropljenje **breskev in nektarin** proti **breskovi kodravosti in listni luknjičavosti koščičarjev** opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6 – 2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	3 kg/ha
Nordox 75 WG	2 kg/ha

Tudi marelice so v fazi nabrekanja brstov (BBCH 01 – 03). Zato prvo škropljenje **marelic** proti **listni luknjičavosti koščičarjev** opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6 – 2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Za zatiranje okužb z breskovo kodravostjo in listno luknjičavostjo koščičarjev je **izdano dovoljenje za nujne primere sredstvu CURATIO žvepleno apnena brozga** (datum veljavnosti: 15. 3. – 14. 7. 2023):

- V BRESKVAH za zatiranje okužb z breskovo kodravostjo (*Taphrina deformans*), breskovo pepelovko (*Sphaerotheca pannosa*) in listno luknjičavostjo koščičarjev (*Stigmina carpophila*) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje.
- V MARELICAH za zatiranje okužb z marelično pepelovko (*Podosphaera tridactyla*) in listno luknjičavostjo koščičarjev (*Stigmina carpophila*) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje.

POZOR: Sredstvo smejo uporabljati le poklicni pridelovalci koščičastega sadja, ki so registrirani za ekološko pridelavo!