

Podatki o publikaciji

Izdaja: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik: Silvo Žveplan
E-pošta uredništva: silvo.zveplan@ihps.si
Uredniški odbor: Silvo Žveplan, Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, Gregor Leskošek



ISSN 2536-2321 (za spletno izdajo)

Letnik 32, št. 05

10. maj 2023

VARSTVO OLJNIH BUČ, BUČ PRED PLEVELI

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v oljnih bučah, bučah.

Preglednica 1: Herbicidi, registrirani v Sloveniji v letu 2023, za uporabo v posevkih oljnih buč, buč in po setvi pred vznikom oljnih buč, buč in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe oljna buča, buča BBCH	Karenca in opombe
CENTIUM 36 CS nekateri vrste O. in Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L	Preem	ČU
CLOMATE nekateri vrste E. Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L	Preem	ČU, manjša uporaba
COLZAMID nekateri vrste E. O. in Š. pl.	napropamid	SC	2,0 - 2,5 L	Pred setvijo z vdelavo na globino 2-5 cm	ČU, manjša uporaba , inkorporacija
DEVIRINOL 45 FL nekateri vrste E. O. in Š. pl.	napropamid	SC	2,0 - 2,5 L	Pred setvijo z vdelavo na globino 2-5 cm	ČU, manjša uporaba , inkorporacija
FLEXIDOR E. Š. pl.	izoksaben	SC	0,75	Preem	114 dni, manjša uporaba , uporaba takoj oz. najkasneje 3 dni po setvi
*SUCCESSOR 600 O. in Š. pl.	petoksamid	EC	2,0 L	Preem	ČU, VPV, buča

Legenda: E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, F- formulacija herbicida, **Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista buč, **ČU**- karenca zagotovljena s časom uporabe, **VPV**- varnostni pas do voda, **FFS** – fitofarmacevtsko sredstvo.

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!

***FFS** - velja prepoved rabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) in na območjih NUV za vključene v KOPOP.

Obvestila poljedelcem

Preglednica 2: Preglednica herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2023, za uporabo v posevkih oljnih buč, buč in po vzniku oljnih buč, buč in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe: oljna buča, buča BBCH	Karenca in opombe
FUSILADE FORTE E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)	fluazifop-p-butil	EC	0,8 - 1,3 L	Po 12 - 14	ČU, manjša uporaba 0,8 L za zatiranje E. O. plevela; 1,3 L za zatiranje Večl. O. plevela (<i>Sorghum halepense</i>), s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero se razreže rizome.
FUSILADE MAX E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)	fluazifop-p-butil	EC	1,0 - 1,5 L	Po 12 - 14	ČU, manjša uporaba 1,0 L za zatiranje E. O. plevela; 1,5 L za zatiranje Večl. O. plevela (<i>Sorghum halepense</i>), s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero se razreže rizome.

Legenda: E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, F- formulacija herbicida, **Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista buč, **ČU**- karenca zagotovljena s časom uporabe, **VPV**- varnostni pas do voda, **FFS** – fitofarmacevtsko sredstvo.

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!

***FFS - velja prepoved rabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) in na območjih NUV za vključene v KOPOP.**

Obvestila poljedelcem

VARSTVO SOJE PRED PLEVELI

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v soji.

Preglednica 3: Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2023, za uporabo v posevkih soje po setvi pred vznikom soje in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo,zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe soja BBCH	Karenca in opombe
CENTIUM 36 CS nekateri vrste O. in Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L	Preem	ČU, manjša uporaba , tretiranje takoj oz. najkasneje 3 dni po setvi
CHANON nekateri vrste E. Š. in O. pl.	aklonifen	SC	3,0 L	Preem	ČU, VPV, manjša uporaba
CLOMATE nekateri vrste E. Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L	Preem	ČU, manjša uporaba
*DUAL GOLD 960 EC E. O. in Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L izven VVO 1,0 L na VVO	Preem	ČU
*EFICA 960 EC E. O. in nekateri vrste E. Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L izven VVO 1,0 L na VVO	Preem	ČU
PROMAN E. Š. in nekateri vrste E. O. pl.	metobromuron	SC	3,0 L	Preem	ČU, VPV
SHARPEN 33 EC E. O. in Š. pl.	pendimetalin	EC	3,0 - 5,0 L	Preem 00-09	ČU, VPV
SHARPEN PLUS E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	2,5 - 4,0 L	Preem 00-09	ČU, VPV
STOMP AQUA E. O. in nekateri vrste Š. pl.	pendimetalin	CS	2,6 L	Preem	ČU, manjša uporaba

Legenda: SZ – soja za zrnje, SZK- soja za zeleno krmo, F- formulacija herbicida,

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista soje, ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe, FFS – fitofarmacevtsko sredstvo.

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!

***FFS - velja prepoved rabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) in na območjih NUV za vključene v KOPOP.**

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Obvestila poljedelcem

Preglednica 4: Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2023, za uporabo v posevkih soje po vzniku soje in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe soja BBCH	Karenca in opombe
*BASAGRAN 480 E. in nek. Večl. Š. pl.	bentazon	SL	1,5- 2,0 L	Po 11-13	ČU, tretiranje pri temperaturah do 25 °C
FOCUS ULTRA E. in Večl. O. pl. in samosevci žit	cikloksidim	EC	2,0 L oz. 1,0 L+1,0 L močila DASH HC 4,0 L oz. 2,0 L+2,0 L močila DASH HC	Po 12-19	56 dni, enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29) večletni oz. pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)
HARMONY 50 SX E. Š. pl.	tifensulfuron-metil	SG	2 x 7,5 g deljena (split) aplikacija, razmak med tretiranjema naj bo 7-14 dni	Po 10-14	manjša uporaba, SZ = ČU, SZK = 14 dni
WISH TOP nekateri vrste E. O. pl. in plazeča pirnica (<i>Elymus repens</i>)	kvizalofop-p-etil	EC	0,625 – 1,17 L	Po 12-18	90 dni

Legenda: SZ – soja za zrnje, SZK- soja za zeleno krmo, F- formulacija herbicida,

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista soje, ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe, FFS – fitofarmacevtsko sredstvo.

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!

***FFS - velja prepoved rabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) in na območjih NUV za vključene v KOPOP.**

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Obvestila poljedelcem

VARSTVO SONČNIC PRED PLEVELI

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v sončnicah.

Preglednica 5: Preglednica herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2023, za uporabo v posevkih sončnic, po setvi pred vznikom sončnic in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe sončnica BBCH	Karenca in opombe
CHALLENGE, CHALLENGE 600 Š. in O. pl.	aklonifen	SC	4,0 L	Preem 00-08	90 dni, VPV
CHANON nekateri vrste O. in Š. pl.	aklonifen	SC	3,0 L	Preem	ČU, VPV
CLINIC XTREME E. in Večl. O. in Š. pl.	glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli	SL	1,33 – 4,0 L ali 1,2-2,0 L	predsetvena priprava tal, pred setvijo, Preem - po setvi	NU, ČU
*DUAL GOLD 960 EC E. O. in Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L izven VVO 1,0 L na VVO	Preem	ČU
*EFICA 960 EC E. O. in nekateri vrste E. Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L 1,0 L na VVO	Preem	ČU
PROMAN E. Š. in nekateri vrste E. O. pl.	metobromuron	SC	3,0 L	Preem	ČU, VPV
SHARPEN 33 EC , E. O. in Š. pl.	pendimetalin	EC	3,0 - 5,0 L	Preem 00-10	ČU, VPV
SHARPEN PLUS , E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	2,5 - 4,0 L	Preem 00-10	ČU, VPV
STOMP AQUA E. O. in nekateri vrste Š. pl.	pendimetalin	CS	2,9 L	Preem	ČU

Legenda: E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, F- formulacija herbicida, **Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza sončnic (npr. BBCH 12) = razvita dva lista sončnice, **ČU**- karenca zagotovljena s časom uporabe, **NU**- karenca zagotovljena z načinom uporabe, **VPV**- varnostni pas do voda.

***FFS - velja prepoved rabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) in na območjih NUV za vključene v KOPOP.**

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Obvestila poljedelcem

Preglednica 6: Preglednica herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2023, za uporabo v posevkih sončnic, po vzniku sončnic in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe sončnica BBCH	Karenca in opombe
FOCUS ULTRA E. in Večl. O. pl. in samosevci žit	cikloksidim	EC	2,0 L oz. 1,0 L + 1,0 L močila DASH HC 4,0 L oz. 2,0 L + 2,0 L močila DASH HC	Po 12-19	ČU, enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29) večletni oz. pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)
FUSILADE FORTE E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)	fluazifop-p-butil	EC	0,8 - 2,5 L	Po, do razvitih šest parov listov	90 dni, 0,8-1,7 L za zatiranje E. O. pl. 1,7-2,5 L za zatiranje Večl. O. pl.
FUSILADE MAX E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)	fluazifop-p-butil	EC	1,0 - 3,0 L	Po, do razvitih šest parov listov	90 dni, 1,0-2,0 L za zatiranje E. O. pl. 2,0-3,0 L za zatiranje Večl. O. pl.
QUICK 5 EC E. in Večl. O. pl.	kvizalofop-p-etil	EC	1,0 - 2,0 L	Po	ČU, pleveli od 2 listov do konca razraščanja (BBCH 12-29)
WISH TOP nekatere vrste E. O. pl. in plazeča pirnica (<i>Elymus repens</i>)	kvizalofop-p-etil	EC	0,625 – 1,17 L	Po 12-18	90 dni

Legenda: E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, F- formulacija herbicida, **Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza sončnic (npr. BBCH 12) = razvita dva lista sončnice, **ČU**- karenca zagotovljena s časom uporabe, **VPV**- varnostni pas do voda.

***FFS - velja prepoved rabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI) in na območjih NUV za vključene v KOPOP.**

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!