

Podatki o publikaciji

Izdaja: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

Urednik: Silvo Žveplan

E-pošta uredništva: silvo.zveplan@ihps.si

Uredniški odbor: Silvo Žveplan, dr. Magda Rak Cizej, Alenka Ferlež Rus,
dr. Sebastjan Radišek



ISSN 2536-2380 (za spletno izdajo)

Letnik 11, št. 4

3. julij 2023

VARSTVO KAPUSNIC PRED ŠKODLJIVCI

Kapusov molj

V zadnjih dneh opazujemo v nasadih kapusnic prisotnost gosenic kapusovega molja (*Plutella xylostella*). V primeru preseženega praga škodljivosti (1 gosenica/rastlino) priporočamo uporabo insekticidov: **Affirm** (1,5 kg/ha; zelje, cvetača, brokoli; največ 3-krat v eni rastni dobi; zelje K = 7 dni; cvetača, brokoli K = 12 dni), **Agree WG** (1 kg/ha; na kapusnicah za zatiranje gosenic škodljivih metuljev, največ 3-krat v eni rastni dobi, K ni potrebna), **Benevia** (0,4 – 0,5 L/ha; cvetača, brokoli, glavnato zelje, brstični ohrovt; največ 1-krat letno na isti površini; K = 7 dni), ***Coragen**, ***Voliam** (125 ml/ha; cvetača, brokoli, glavnato zelje, ohrovt; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 1 dan), **Decis 100 EC** (75 ml/ha; brstični ohrovt, cvetača, zelje; največ 1-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), **Delfin WG** (0,5 kg/ha; kapusnice; uporaba največ 6-krat v eni rastni dobi; K = ni potrebna), **Karate Zeon 5 CS** (0,15 L/ha; brstični ohrovt, zelje, kitajsko zelje (MU), cvetača (MU); kitajsko zelje največ 1-krat v eni rastni sezoni; brstični ohrovt, zelje, cvetača največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni za kitajsko zelje in cvetačo ter K = 21 dni za zelje, brstični ohrovt), **Lepinox plus** (1 kg/ha; brstični ohrovt, brokoli, glavnati ohrovt, zelje, kitajsko zelje, največ 3 tretiranja za eno generacijo; K ni potrebna), **Mimic** (0,3 – 0,4 L/ha; brokoli, glavnato zelje, glavnati ohrovt, kitajsko zelje, listni ohrovt; uporaba največ 1-krat v eni rastni sezoni; K = 14 dni), **Neemazal-T/S** (3 L/ha; zelje, glavnati ohrovt, brstični ohrovt; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni). Insekticidi Affirm, Mimic, *Coragen, Karate Zeon, Neemazal – T/S in *Voliam zatirajo tudi kapusovo sovko.

LEGENDA: K = karenca, MU = manjša uporaba. Za insekticid označen z zvezdico pred imenom (*FFS) velja prepoved uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI).

Belini

Na opazovanih lokacijah beležimo pojave prvih gosenic kapusovega belina (*Pieris brassicae*) oz. repnega belina (*Pieris rapae*). Pridelovalce kapusnic opozarjamo, da pregledajo svoje nasade. V primeru preseženega praga škodljivosti (1 gosenica/rastlino) priporočamo uporabo insekticidov: **Affirm** (1,5 kg/ha; zelje, cvetača, brokoli; največ 3-krat v eni rastni dobi; zelje K = 7 dni; cvetača, brokoli K = 12 dni), **Agree WG** (1 kg/ha; na kapusnicah za zatiranje gosenic škodljivih metuljev, največ 3-krat v eni rastni dobi, K ni potrebna), **Benevia** (0,4 – 0,5 L/ha; cvetača, brokoli, glavnato zelje, brstični ohrovt; največ 1-krat letno na isti površini; K = 7 dni), ***Coragen**, ***Voliam** (125 ml/ha; cvetača, brokoli, glavnato zelje, ohrovt; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 1 dan), **Decis 100 EC** (75 ml/ha; zelje, brstični ohrovt, cvetača; največ 1-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), **Delfin WG** (0,5 kg/ha; kapusnice; uporaba največ 6-krat v eni rastni dobi; K = ni potrebna), **Karate Zeon 5 CS** (0,2 L/ha za brstični ohrovt in zelje ter odmere 0,15 L/ha za kitajsko zelje (MU) in cvetačo (MU); kitajsko zelje največ 1-krat v eni rastni sezoni; brstični ohrovt, zelje, cvetača največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni za kitajsko zelje in cvetačo ter K = 21 dni za zelje in brstični ohrovt), **Mimic** (0,3–0,4 L/ha; brokoli, glavnato zelje, glavnati ohrovt, kitajsko zelje, listni ohrovt; uporaba največ 1-krat v eni rastni

Obvestila vrtnarjem

sezoni; K = 14 dni), **Neemazal – T/S** (3 L/ha; zelje, glavnati ohrovt, brstični ohrovt; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni),

LEGENDA: K = karenca, MU = manjša uporaba. Za insekticid označen z zvezdico pred imenom (*FFS) velja prepoved uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVOI).

Pred vsakim škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob uporabi FFS dosledno upoštevajte, še posebej bodite pozorni na navodila za varovanje koristnih organizmov in voda!