


Podatki o publikaciji

Izdaja: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

Urednica: Alenka Ferlež Rus

E-pošta uredništva: alenka.ferlez-rus@ihps.si

Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek,
Gregor Leskošek



ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)

Letnik 33, št. 7

26. marec 2024

VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ

Na območju Celjske in Koroške regije so zgodnje sorte češenj na izpostavljenih legah v fenološki fazi stadija balona BBCH 59 - do začetka cvetenja BBCH 61. Pozne sorte češenj in višenj so v fenološki fazi zelenega popka BBCH 55 – 56.

Spremljajte fenološki razvoj. Svetujemo, da opravite prvo škropljenje proti **cvetni moniliji**, ko je odprtih 10 % cvetov. Ugodne pogoje za širjenje okužb v večjem obsegu ustvarja deževno in hladno vreme. V primeru deževnega vremena v času polnega cvetenja opravite še drugo škropljenje, ko začnejo odpadati prvi venčni listi.

Škropljenje češenj in višenj opravite z enim od pripravkov, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek	Odmerek (koncentracija)
Luna experience	0,2 L na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 0,6 L/ha
Revyona	1,8 L/ha
Signum	0,25 kg na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 0,75 kg/ha
Zenby	0,9 L/ha
Duaxo koncentrat	1,1 L na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljeni 3,3 L/ha.
Amylo –X	1,5 – 2,5 kg/ha

Pripravek na osnovi mikroorganizmov Amylo-X ima dovoljenje za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Samo za češnje so proti cvetni moniliji registrirani še pripravki, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek	Odmerek (koncentracija)
Prolectus	330 g na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 1 kg/ha
Switch 62,6 WG	0,08%, najvišji dovoljen odmerek 1 kg/ha
Teldor SC 500	0,5L/ha na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 1,5 L/ha
Libreto	0,5 L/ha na 1 m višine, najvišji dovoljen odmerek 1,5 L/ha
Serenade ASO	8 L/ha

Pripravek na osnovi mikroorganizmov Serenade ASO ima dovoljenje za uporabo tudi v ekološki pridelavi.