

Podatki o publikaciji

Izdaja: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

Urednik: Silvo Žveplan

E-pošta uredništva: silvo.zveplan@ihps.si

Uredniški odbor: Silvo Žveplan, dr. Magda Rak Cizej, Alenka Ferlež Rus,
dr. Sebastjan Radišek



ISSN 2536-2380 (za spletno izdajo)

Letnik 12, št. 2

8. maj 2024

VARSTVO FIŽOLA PRED PLEVELI

Pridelovalci fižola so v preteklih dneh pričeli s saditvijo fižola, zgodnejši posevki so v zgodnjih fazah kalitve. Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v posevkih fižola.

Preglednica 1: Selektivni herbicidi, registriranih v Sloveniji v letu 2024, za uporabo v nasadih fižola po setvi pred vznikom fižola in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe fižol BBCH	Karenca in opombe
BOXER O. in Š. pl.	prosulfokarb	EC	5,0 L	Preem	ČU, zagotovljena mora biti dobra pokritost semena (globina setve najmanj 8 cm).
CHANON nekatero vrste E. Š. in O. pl.	aklonifen	SC	3,0 L	Preem, po setvi pred vznikom fižola	ČU, manjša uporaba , v fižolu (za sveže in suho zrnje).
CLOMATE nekatero vrste E. Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L	Preem, od faze suhega semena do vznika koreninic BBCH 00-05	ČU, v fižolu (za suho in sveže zrnje ter stročje).
FRESCO E. Š. in O. pl.	metobromuron	SC	2,0 L	Preem	ČU, samo v fižolu za stročje in sveže zrnje. Uporaba za pridelavo fižola za suho zrnje ni dovoljena!
STOMP AQUA E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	CS	2,9 L	Preem	ČU, manjša uporaba .

Legenda: E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, F - formulacija herbicida, **Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista fižola, **ČU**- karenca je zagotovljena s časom uporabe, **FFS** – fitofarmacevtsko sredstvo.

OPOZORILO: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!

Obvestila vrtnarjem

Preglednica 2: Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2024, za uporabo v nasadih fižola po vzniku fižola in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe fižol BBCH	Karenca in opombe
AGIL 100 EC E. in Večl. O. pl.	propakvizafop	EC	0,75 - 1,5 L	Po, BBCH 13-29	60 dni.
*BASAGRAN 480, *BENTA 480 SL, E. in nek. Večl. Š. pl.	bentazon	SL	2,0 L v deljeni (split) aplikaciji (1,0 + 1,0 L), med aplikacijama 7-14 dni	Po, BBCH 12-14 do višine posevka največ 5 cm	ČU, uporaba pri temperaturah do 25 °C! fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje).
FOCUS ULTRA E. O. in samosevci žit Večl. O. pl. (močila Dash HC ni v prodaji v 2024)	cikloksidim	EC	1,0 - 2,0 L + M ali 2,0 - 4,0 L	Po, BBCH 12-19	56 dni fižol v zrnju (suh), 28 dni fižol v stroku, E. oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29), večletni oz. pl. do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15).
FREQUENT E. in Večl. O. pl.	fluazifop-p-butil	EC	2,0 - 3,0 L	Po, BBCH 11-50 od vznika do začetka cvetenja	42 dni, fižol (za stročje in zrnje).
FUSILADE FORTE E. O. pl. in ljujk (<i>Lolium</i> spp.)	fluazifop-p-butil	EC	0,8 - 1,3 L	Po, pred cvetenjem do BBCH 50	90 dni fižol za suho zrnje, 28 dni fižol za stročje.
FUSILADE MAX E. in Večl. O. pl. in ljujk (<i>Lolium</i> spp.)	fluazifop-p-butil	EC	1,6 L	Po, pred cvetenjem do BBCH 50	90 dni fižol za suho zrnje, 28 dni fižol za stročje.
SELECT SUPER E. O. pl.	kletodim	EC	1,0 L	Po, BBCH 12-19	30 dni, fižol (za stročje in sveže zrnje).
WISH TOP E. O. pl. in plazeča pirnica (<i>Elymus repens</i>) (ni v prodaji v 2024)	kvizalofop-p-etil	EC	0,5 L 1,1 L - plazeča pirnica	Po, BBCH 12-29	50 dni, manjša uporaba , fižol (za stročje in sveže zrnje).
ZETROLA E. in Večl. O. pl. (ni v prodaji v 2024)	propakvizafop	EC	0,75 - 1,5 L	Po, BBCH 13-29	60 dni.

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!

***FFS - za fitofarmacevtsko sredstvo velja prepoved uporabe na (VVOI) - najožjih vodovarstvenih območjih in pri pridelovalcih vključenih v program KOPOP - Vodni viri in KOL-3.**

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitev.