


Podatki o publikaciji

Izdaja: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

Urednica: Alenka Ferlež Rus

E-pošta uredništva: alenka.ferlez-rus@ihps.si

Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek,
Gregor Leskošek



ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)

Letnik 33, št. 13

7. maj 2024

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Fenološka faza

Na območju Celjske regije je jablana v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 71 - 72. Pri sortah gala, zlati delišes, elstar, fuji je premer plodičev od 13 do 18 mm, medtem ko pri sortah jonagold, breaburn, idared med 18 do 22 mm. Hruška je povprečno na opazovano lokacijo in sorto v fenološki fazi BBCH 72.

Jablanov škrlup in pepelasta plesen

Od 1. do 7. maja so bili na večini opazovanih sadjarskih lokacijah dvakrat izpolnjeni pogoji za okužbo z jablanovim škrlupom. Med 1. in 2. majem so bili izpolnjeni pogoji za lahko ali zmerno, med 3. in 4. majem, ko je padlo od 7 do 15 mm deža, pa za zmerno ali močno okužbo. Tudi v naravi smo zabeležili močne izbruhe askospor, vendar so ti bili nekoliko nižji kot ob izpolnjenih pogojih za okužbo v zadnji dekadi aprila.

Glede na vremensko napoved nadaljujte s preventivnim pristopom varstva proti škrlupu in pred napovedanimi padavinami opravite škropljenje s kontaktnimi fungicidi na osnovi a.s. ditianon: **Delan Pro** (2,5 L/ha), **Alcoban** (0,75kg/ha) ali **Delan 700 WG** (0,75 kg/ha).

V ekološki pridelavi se lahko uporabi pripravek **Curatio** – žvepleno apnena brozga, ki ima dovoljenje za nujne primere in ga smejo uporabiti samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

V nasadih, ki so močno okuženi s pepelasto pesnijo, svetujem tudi dodajanje pripravkov kot sta: **Sercadis** (0,25 L/ha) ali **Luna experience** (0,25 L/1m višine krošnje/ha do max. 0,75 L/ha). Sercadis se uporablja tudi za zmanjšanje okužb jablanovega in hruševega škrlupa (0,25 – 0,3 L/ha). Prav tako bi bila smiselna uporaba sicer registriranih pripravkov na osnovi strobilurinov kot so: **Stroby WG** (0,2 kg/ha) ali **Zato 50 WG** (0,15 kg/ha), ki pa se ne tržijo.

V ostalih nasadi za zmanjšanje infekcijskega potenciala dodajate enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: **AzumoWG**, **Cosan**, **Pepelin**, **Kumulus DF**, **Microthiol specilal**, **Microthiol disperss Thiovit jet**, **Vindex 80 WG**, **Sulfar** ali **Vertipin**. Uporaba pripravkov na osnovi močljivega žvepla je **učinkovita v toplem vremenu (temperature nad 15°C)**.

Jabolčni zavijač

Ob otoplitvi vremena se nadaljuje tudi let jabolčnega zavijača. O dinamiki leta in optimalnih rokih zatiranja vas bomo pravočasno obveščali.