


Podatki o publikaciji

Izdaja: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

Urednica: Alenka Ferlež Rus

E-pošta uredništva: alenka.ferlez-rus@ihps.si

Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek,
Gregor Leskošek



ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)

Letnik 33, št. 15

16. maj 2024

VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ

Češnjeva muha

Dinamiko pojava in velikost populacije češnjeve muhe spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami (dve lepljivi plošči na hektar).

Prag škodljivosti je presežen, če ulovimo eno muho na dve postavljeni plošči od faze, ko češnje spreminjajo barvo iz zelene v rumeno.

Ob preseganju praga škodljivosti opravite škropljenje z enim od insekticidov kot sta:

Exirel (75 mL/hL oz. največ 1 L/ha) – karenca 7 dni ali **Mospilan 20 SG** (0,375 kg/ha) - karenca 14 dni. Prav tako lahko uporabite biotični insekticid na osnovi glive *Beauveria bassiana* **Naturalis** (2 L/ha), ki nima karence. Z njim opravite vsaj tri tretiranja v časovnem razmiku 5 do 7 dni.

Za povečanje učinkovitosti lahko insekticidom dodate beljakovinsko prehransko vabo **Nutrel** (1,5 % konc.).

Za zmanjšanje deleža poškodovanih plodov, ki jih povzroča češnjeva muha lahko uporabite tudi insekticidno vabo (past) **DECIS TRAP ČEŠNJEVA MUHA**. Vaba je že pripravljena za neposredno uporabo. V nasad češenj se enakomerno porazdeli 100 vab na ha. Karenca je zagotovljena z načinom uporabe.

Pri zgodnjih sortah češenj muhe ni potrebno zatirati. Tudi na vrtovih NE priporočamo zatiranja češnjeve muhe z insekticidi. Svetujemo, da v vrtovih obesite rumene lepljive plošče na katere se lovi češnjeva muha. Obesite 10 plošč na drevo (na zahodno in južno stran krošnje). **Po končanem obiranju plošče odstranite.**

Plodova vinska mušica

V nasade češenj in višenj za spremljanje pojava plodove vinske mušice izobesite **prehranske pasti**. Te lahko naredite sami. V 0,5 L plastenko na zgornjem delu zavrtate 4 do 5 luknjic, katerih premer naj ne bo večji od 5 mm in zgornji del plastenke pobarvate z rdečo barvo, ki privablja škodljivko. V plastenko nalijete 1 dl raztopino jabolčnega kisa in rdečega vina (razmerje 3:1) in dodate čajno žličko sladkorja (1 žličko na liter raztopine). Platenko zaprite in jo obesite v nasad na višino 1,5 m od tal. V času dozorevanja plodov redno pregledujte vabe.

Obvestila sadjarjem

Za zatiranje plodove vinske mušice na češnjah in višnjah so registrirani naslednji pripravki:

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Karenca (dni)
Exirel	75 mL/hL oz. največ 1 L/ha	7
Laser Plus (manjše uporabe)	0,15 L/ha	7
Asset Five	0,96 L v 1500 L vode na ha oziroma v 0,064 %	7
Decis trap plodova vinska mušica	100 vab /ha - obesi se na sredino krošnje 1,8 -2 m od tal	ni potrebna

Navadna sadna gniloba

V nasadih poznih sort češenj zaradi pogostih padavin opravite proti navadni sadni gnilobi preventivno škropljenje z enim od pripravkov, ki so navedeni v naslednji preglednici.

Pripravek	Odmerek (koncentracija)	Karenca (dni)
Luna experience	0,2 L na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 0,6 L/ha	7
Libreto	1 L/ha	3
Prolectus	400 g na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 1,2 kg/ha	1
Revyona	1,8 L/ha	3
Signum	0,25 kg na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 0,75 kg/ha	7
Switch 62,6 WG	0,08%, najvišji dovoljen odmerek 1 kg/ha	7
Teldor SC 500	0,5 L na 1 m višine krošnje /ha, najvišji dovoljen odmerek 1,5L/ha	3
Amylo -X	1,5 – 2,5 kg/ha	ni potrebna
Serenade ASO	8 L/ha	ni potrebna
Taegro	0,185-0,37 kg/ha	1

Pripravki na osnovi mikroorganizmov Amylo-X, Serenade ASO in Taegro imajo dovoljenja za uporabo tudi v ekološki pridelavi.