

Podatki o publikaciji

Izdaja: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

Urednica: Alenka Ferlež Rus

E-pošta uredništva: alenka.ferlez-rus@ihps.si

Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus in Silvo Žveplan



ISSN 2536-2372 (za spletno izdajo)

Letnik 30, št. 6

23. maj 2024

Fenološki razvoj vinske trte

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 53-55 (socvetja jasno vidna do socvetja nabrekla).

Peronospora in oidij vinske trte

Vremenska napoved napoveduje nadaljevanje toplega in nestanovitnega vreme s pogostimi plohami in nevihtami, kar ustvarja pogoje za nadaljnje primarne okužbe s peronosporo vinske trte. Zato svetujemo, da nadaljujete škropljenje z enim od kombiniranih sistemsko ali polsistemsko delujočih pripravkov kot so: **Allum** (2,5 kg/ha), **Ampexio** (0,5 kg/ha), **Cymbal** (0,125kg/ha), **Folpan gold** (2 kg/ha), **Reboot** (0,4 kg/ha), **Twingo** (3 kg/ha), **Valis F** (2 kg/ha), **Ovrego** (0,8 L/ha), **Orondis ultra** (0,67 L/ha), **Zorvec vinabel** (0,38 L/10.000 m² tretirane površine listne stene, največji dovoljeni odmerek 0,6 L/ha), **Sfinga Extra WDG** (1,5 kg/ha), **Mikal Flash** (4kg/ha), **Momentum trio** (3kg/ha). Škropljenje lahko opravite tudi s pripravkoma na osnovi a.s. ciazofamid kot je **Videryo F** (2,5 L/ha) ali **Mildicut** (4 L/ha).

Pripravkom **Allum**, **Cymbal**, **Orondis** dodajte polovični odmerek enega od kontaktnih fungicidov.

Prav tako lahko uporabite pripravke na osnovi kalijevaga fosfonata **Foshield** (1 L/ha), **Sorale LX** oz. **LBG -01F34** 4 L/ha- pri samostojni rabi ali 3 L/ha – pri kombinirani uporabi s fungicidi na osnovi a.s. folpet ali Delan pro (3L/ha).

Presledki med škropljenji naj bodo dolgi od 8 do 10 dni.

V ekološki pridelavi za zatiranje peronospore uporabite enega izmed pripravkov na osnovi bakra kot so: **Badge WG**, **Cuprablau Z 35 WG**, **Cuprablau Z 35 WP**, **Cupoxat**, **Kocide 2000** ali **Nordox 75 WG**.

Za delno zmanjševanje okužb s peronosporo in oidijem vinske trte lahko uporabite pripravek **Fytosave** (2L/ha) – registriran tudi v ekološki pridelavi. Sredstvo FYTOSAVE je fungicid iz skupine signalnih molekul (elicitorjev), ki sprožijo imunski odziv rastlin.

Za zatiranje **oidija** dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so:

Pripravek	Odmerek
Cosan, Kumulus DF, Pepelin, Microthiol special, Microthiol disperss Thiovit Jet, Vindex 80 WG, Sulfar	3 - 8 kg/ha
Cosavet DF, Močljivo žveplo Karsia DF	3,6 - 8 kg/ha
Biotip Sulfo 800 SC, Pol- Sulphur 80 WG, WP, Pol- Sulphur 800 SC	4 L/ha
Azumo WG	4 - 8 kg/ha
Vertipin od 7 razprtih listov dalje	5 - 7,5 L/ha
Cosinus	8 kg/ha

Ob toplem vremenu z visoko nočno in jutranjo relativno zračno vlago lahko pričakujemo povečano nevarnost za okužbe z oidijem vinske trte. V vinogradih, kjer ste že v preteklem letu imeli težave z obvladovanjem oidija za preprečevanje okužb uporabite enega od naslednjih pripravkov: **Sercadis**

Obvestila vinogradnikom

(0,15 L/ha), **Karathane Gold 350 EC** (0,5 L/ha), **Kusabi 300 SC** (0,15 L/ha), **Topas 100 EC** (0,3 L/ha), **Score 250 EC** (0,2 L/ha), **Difcor 250 EC** (0,12 L/ha), **Spirox D** (0,5 L/ha), **Unicorn DF** (2,2 kg/ha) ali uporabite pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: **Folicur EW 250** (0,4 L/ha), **Orius 25 EW** (0,4 L/ha) ali **Tebusha 25%EW** (0,4 L/ha).

Za zmanjševanje okužb z oidijem lahko uporabite pripravke na osnovi mikroorganizmov kot so **Sonata** (5 L/ha), **Serenade ASO** (8 L/ha) - registracija samo za namizno grozdje, **Taegro** (0,185 – 0,37 kg/ha); od začetka cvetenja pa tudi pripravka na osnovi kalijevega hidrogen karbonata kot sta: **Karbicare** (5 kg/ha) ali **Vitisan** (6 kg/ha). Prav tako lahko za zatiranje oidija uporabite biotični fungicid **AQ-10** (35 g/ha). Vsi navedeni pripravki so registrirani tudi v ekološki pridelavi.

Toča

V primeru toče dajte prednost kombiniranim pripravkom, ki vsebujejo a.s. folpet kot so: **Folpan gold**, **Twingo**, **Valis F**, **Sfinga extra**, **Mikal Flash** ali **Momentum trio**. Navedenim pripravkom priporočamo dodajanje sredstev za krepitev rastlin kot so: **Algo-Plasmin**, **Drin**, **Basfoliar aktiv**, **Protifert LMW** in podobnih.

Ameriški škrdžatek

Pri pregledu vinogradov na prisotnost ameriškega škrdžatka, prenašalca zlate trsne rumenice, najdemo ličinke prvega razvojnega stadija - L1. O bionomiji razvoja in optimalnih rokih zatiranja vas bomo sproti obveščali.