

Seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v soji, v letu 2025

Navajamo seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v soji.

Seznam je objavljen v okviru izdaje prognostičnih obvestil na Portalu prognostičnih obvestil

[Povezava na register Fitofarmaceutskih sredstev UVHVVR \(MKGP\)](#)

Silvo Žveplan, 7. maj 2025



Preglednica 1: Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2025, za uporabo v posevkih soje po setvi pred vznikom soje in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe soja BBCH	Karenca in opombe
CENTIUM 36 CS nekateri vrste O. in Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L	Preem	ČU, manjša uporaba, tretiranje takoj oz. najkasneje 3 dni po setvi
CHANON nekateri vrste E. Š. in O. pl.	aklonifen	SC	3,0 L	Preem	ČU, VPV, manjša uporaba
CHIMRO, CLOMATE nekateri vrste E. Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L	Preem, BBCH 00-12	ČU, manjša uporaba
PROMAN E. Š. in nekateri vrste E. O. pl.	metobromuron	SC	3,0 L	Preem 00-08	ČU, VPV
SHARPEN 33 EC E. O. in Š. pl.	pendimetalin	EC	3,0 - 5,0 L	Preem 00-09	ČU, VPV
SHARPEN PLUS E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	2,5 - 4,0 L	Preem 00-09	ČU, VPV
STOMP AQUA E. O. in nekateri vrste Š. pl.	pendimetalin	CS	2,6 L	Preem	ČU, manjša uporaba

Legenda:

- SZ – soja za zrnje, SZK- soja za zeleno krmo, F- formulacija herbicida,
- E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli,
- Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov,
- ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,
- FFS – fitofarmacevtsko sredstvo.

OPOZORILO: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Preglednica 2: Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2025, za uporabo v posevkih soje po vzniku soje in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe soja BBCH	Karenca in opombe
*BASAGRAN 480 E. in nek. Večl. Š. pl.	bentazon	SL	1,5- 2,0 L	Po 11-13	ČU, tretiranje pri temperaturah do 25 °C
*BENI E. in nek. Večl. Š. pl. ter samosevna oljna ogrščica	bentazon	SG	1,0 kg	Po 11-16	ČU, tretiranje pri temperaturah do 23 °C
FOCUS ULTRA E. in Večl. O. pl. in samosevci žit	cikloksidim	EC	2,0 – 4,0 L	Po 12-19	56 dni, enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29) večletni oz. pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)
HARMONY 50 SX E. Š. pl.	tifensulfuron-metil	SG	2 x 7,5 g + M deljena (split) aplikacija, razmak med tretiranjema naj bo 7-14 dni	Po 10-14	manjša uporaba, SZ = ČU, SZK = 14 dni
SELECT SUPER E. O. pl. in plazeča pirnica (<i>Elymus repens</i>)	kletodim	EC	1,0 – 2,0 L	Po 12-30	120 dni, manjša uporaba, 1,0 L za zatiranje E. O. plevelov; 2,0 L za plazečo pirnico
WISH TOP nekateri vrste E. O. pl. in plazeča pirnica (<i>Elymus repens</i>)	kvizalofop-p-etil	EC	0,625 – 1,17 L	Po 12-18	90 dni

Legenda:

- SZ – soja za zrnje, SZK- soja za zeleno krmo, F - formulacija herbicida, M - močilo
- E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni,
- pl. – pleveli,
- Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka,
- razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista soje,
- ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,
- FFS – fitofarmacevtsko sredstvo.

OPOZORILO: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!

* FFS - za fitofarmacevtsko sredstvo velja prepoved uporabe na (VVOI) - najožjih vodovarstvenih območjih in pri pridelovalcih vključenih v operacije Vodni viri, Ohranjanje kolobarja – stopnja III in Varovalni pasovi ob vodotokih intervencije IRP 18.02 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Naravni viri (KOPOP – Naravni viri) iz Strateškega načrta SKP 2023–2027.

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!