

V Sloveniji dovoljeni selektivni herbicidi za spomladansko rabo v žitih v letu 2025

Uspeh varstva pred pleveli je odvisen predvsem od: pravilne ocene zapleveljenosti, izbire primernega herbicida in pravočasne ter kakovostne aplikacije. Žito je na konkurenco plevelov najbolj občutljivo v času razraščanja žit, ko zapleveljenost najbolj ovira razvoj žit in posledično zmanjšuje pridelek.

Seznam je objavljen v okviru izdaje prognostičnih obvestil na Portalu prognostičnih obvestil

[Povezava na register Fitofarmaceutskih sredstev UVHVVR \(MKGP\)](#)

Silvo Žveplan, 11. marec 2025



Preglednica: Seznam v Sloveniji dovoljenih selektivnih herbicidov za spomladansko rabo v žitih v letu 2025

Fitofarmaceutsko sredstvo	Aktivna snov (%)	Odmerek na ha	Delovanje na vrste plevelov	ŽITO (uporaba v žitu)	Čas rabe (BBCH žit), opombe
ADENTIS	tribenuron 75	20 g/ha	E. Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ.), jara (pš., ječ.)	spomladi: BBCH 31-39
ALISTER NEW	diflufenikan 12 + jodosulfuron 0,75 + mezosulfuron 0,9	1,0 L/ha	O. in Š. PLEVELI	oz. pš.	BBCH 12-29
ALLIANCE	diflufenikan 60 + metsulfuron 6	100 g/ha	E. Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ., rž, tritikala), jara (pš., ječ.)	spomladi: BBCH 13-29
ALLY SX	metsulfuron 20	30 g/ha	E. Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ., pira, rž, tritikala), jara (pš., ječ., oves)	ozimine: BBCH 21-39 jarine: BBCH 12-39
ALTIVATE	mezosulfuron 5,83	150-250 g/ha	E. O. PLEVELI	oz. (pš., tritikala, rž)	spomladi: BBCH 20-32
ARNOLD	diflufenikan 20 + flufenacet 40	0,6 L/ha	O. in Š. PLEVELI	oz. pš.	BBCH 00-09 ali BBCH 11-22
ATLANTIS STAR	jodosulfuron 0,9 + mezosulfuron 4,5 + tienkarbazon 2,25	200 - 333 g/ha	O. in Š. PLEVELI	oz. (pš., tritikala)	samo spomladi BBCH 13-32
AVOXA	pinoksaden 33,3 + piroksulam 0,833	1,35 - 1,8 L/ha	E. O. in Š. PLEVELI	oz. (pš., tritikala, rž)	spomladi: BBCH 12-32
AXIAL	pinoksaden 5	0,6 – 1,2 L/ha	E. O. PLEVELI	oz. (pš., ječ.), jara (pš., ječ.)	samo spomladi BBCH 13-39
AXIAL ONE	florasulam 0,5 + pinoksaden 4,5	1,0 - 1,3 L/ha	E. Š. in O. PLEVELI	oz. (pš., ječ.), jara (pš., ječ.)	samo spomladi BBCH 11-37
*BASAGRAN 480	bentazon 48	2,0 L/ha	E. in nekateri VEČL. Š. PLEVELI	pš., ječ., rž, oves, tritikala	BBCH 21-30
*BIATHLON 4D	florasulam 5,4 + tritosulfuron 71,4	70 g/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz. in jara pš., rž, ječ., oves, tritikala, pira	spomladi BBCH 13-30-(39), priporočeno dodati močilo DASH HC 1,0 L/ha
BONACA	fluroksipir 25	0,6-0,8 L/ha	E. Š. + nekateri VEČL. Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ.)	BBCH 12-39
BOUDHA	metosulfuron 25 + tribenuron 25	20 g/ha	E. Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ., rž, tritikala), jara (pš., ječ.), MU oz. in jara oves	spomladi: ozimine BBCH 21-39, jarine BBCH 12-39
CLYDE FX	florasulam 0,1 + fluroksipir 10	1,5 L/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ.)	spomladi BBCH 22-45
CLYDE FX	florasulam 0,1 + fluroksipir 10	1,5 L/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	jara (pš., ječ.)	BBCH 22-34
CLYDE FX	florasulam 0,1 + fluroksipir 10	1,5 L/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	jara oves	BBCH 23-31
CLYDE FX	florasulam 0,1 + fluroksipir 10	1,5 L/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz. rž	spomladi BBCH 26-39,
CLYDE FX	florasulam 0,1 + fluroksipir 10	1,5 L/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz. tritikala	spomladi BBCH 17-32

Fitofarmacevtsko sredstvo	Aktivna snov (%)	Odmerek na ha	Delovanje na vrste plevelov	ŽITO (uporaba v žitu)	Čas rabe (BBCH žit), opombe
CLYDE FX	florasulam 0,1 + fluroksipir 10	1,5 L/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz. trda pš. (durum)	spomladi BBCH 29-37
CORELLO DUO	florasulam 1,42 + piroksulam 7,08	170 - 265 g/ha	O. in Š. PLEVELI	oz. pš., oz. rž, tritikala, pira	spomladi BBCH 21-31 + močilo Nu-Film 0,1 L/ha
CORIDA	tribenuron 75	20 g/ha	E. Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ.), jara (pš., ječ.)	spomladi BBCH 31-39
*DUPLOSAN KV	mekoprop - P 60	2,0 L/ha	Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ.), jara (pš., ječ.)	BBCH 21-31
*DUPLOSAN KV 600	mekoprop - P 60	1,5 L/ha	Š. PLEVELI	oz: (pš., ječ., rž, tritikala), jara (pš., ječ., oves)	BBCH 21-29
ELTIVIS	fluroksipir 25	0,6-0,8 L/ha	E. Š. + nekateri VEČL. Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ.)	BBCH 12-39
*EMCEE	MCPA 75	1,0 L/ha	Š. PLEVELI	oz: (pš., ječ., oves, rž, tritikala)	BBCH 31-39
*EMCEE	MCPA 75	1,0 L/ha	Š. PLEVELI	jara: (pš., ječ., oves, rž)	BBCH 13-32
ERGON	metsulfuron 6,8 + tifensulfuron 68,2	70 g/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz. pš.	oz. in jara. pš. BBCH 12-39
ERGON	metsulfuron 6,8 + tifensulfuron 68,2	60 g/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	jara (pš., ječ.)	jari ječ. BBCH 13-39
FINY	metosulfuron 20	30 g/ha	E. Š. PLEVELI	oz. (pš., rž, tritikala)	BBCH 23-39, priporoča se spomladansko škropljenje
FLAME	tribenuron 50	30 g/ha	Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ.), jari ječ.	spomladi BBCH 13-39
FLASH 500 SC	diflufenikan 50	0,28 L/ha	E. Š. PLEVELI in navadni srakoperec (Apera spica venti)	oz. (pš., ječ.)	BBCH 00-09 ali BBCH 11-22
FLUROSTAR FORTE	fluroksipir 40	0,5 L/ha	E. Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ., rž, tritikala), oz. in jari oves (MU)	BBCH 12-31
FLUROSTAR 200	fluroksipir 20	1,0 L/ha	E. Š. PLEVELI in plezajoča lakota (Galium aparine)	oz. (pš., ječ.), rž, tritikala	ozimine BBCH 12-31
FLUROSTAR 200	fluroksipir 20	0,75 L/ha	E. Š. PLEVELI in plezajoča lakota (Galium aparine)	jara (pš., ječ.)	jarine BBCH 12-39
FLUROSTAR SUPER	fluroksipir 10 + florasulam 0,1	1,5 L/ha	plezajoča lakota (Galium aparine) in navadna zvezdica (Stellaria media)	oz. (pš., ječ., rž, tritikala)	BBCH 14-29
FLYER	florasulam 5	0,15 L/ha	Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ., rž)	samo spomladi BBCH 13-39

Fitofarmacevtsko sredstvo	Aktivna snov (%)	Odmerek na ha	Delovanje na vrste plevelov	ŽITO (uporaba v žitu)	Čas rabe (BBCH žit), opombe
FLYER	florasulam 5	0,1 L/ha	Š. PLEVELI	jari ječ.	samo spomladi BBCH 13-39
GRODYL	amidosulfuron 75	40 g/ha	Š. PLEVELI	pš., ječ., oves, tritikala, rž, pira	BBCH 13-37
HERBOCID XL	2,4-D 60	1,25 L/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz. in jara (pš., ječ., tritikala), oz., rž	BBCH 24-29
HUSSAR OD	jodosulfuron 10	0,1 L/ha	E. in nekateri VEČL. Š. PL. ter nekateri O. PLEVELI	oz. in jara (pš., ječ., rž, tritikala)	ozimine: BBCH 21-37 jarine: BBCH 13-29
HUSSAR PLUS	jodosulfuron 5,0 + mezosulfuron 0,75	0,2 L/ha	E. Š. in O. PLEVELI	oz. (pš., rž, tritikala)	škropljenje le spomladi, ozimine: BBCH 13-32
HUSSAR PLUS	jodosulfuron 5,0 + mezosulfuron 0,75	0,15 L/ha	E. Š. in O. PLEVELI	jara (pš., ječ.)	škropljenje le spomladi, jarine: BBCH 13-30
HUSSAR STAR	jodosulfuron 3,3 + tienkarbazon 2,5	0,2 - 0,3 kg/ha	E. Š. in O. PLEVELI	oz. (pš., rž, tritikala)	spomladi BBCH 21- 32 + močilo MERO 1 L/ha
LECTOR DELTA	diflufenikan 50 + florasulam 5	0,1 L/ha	Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ., rž, tritikala), jara (pš., ječ.)	spomladi BBCH 21- 32
*LONTREL 72 SG	klopiramid 72	170 g/ha	nekateri Š. PLEVELI	oz. in jara (pš., ječ., oves)	BBCH 21-31
MAJOR 300 SL	klopiramid 30	0,3 - 0,4 L/ha	nekateri Š. PLEVELI	oz. pš.	spomladi BBCH 20- 29
MEZZO	metsulfuron 20	20 – 30 g/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz., in jara pš., oz. in jari ječ., tritikala, oves	spomladi; pš., oves, tritikala: BBCH 12-39 ječ. BBCH 13-39
MUSTANG 306 SE	2,4-D 2-EHE 45,24 + florasulam 6,25	0,4 - 0,6 L/ha	E. Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ.), jara (pš., ječ.)	BBCH 21-31
MUSTANG FORTE	2,4-D 18 + aminopiramid 1 + florasulam 0,5	1,0 L/ha	Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ., rž, tritikala)	ozimine: BBCH 21-32
MUSTANG FORTE	2,4-D 18 + aminopiramid 1 + florasulam 0,5	0,8 L/ha	Š. PLEVELI	jara: (pš., ječ., oves)	jarine: BBCH 13-31
PALLAS 75 WG	piroksulam 7,5	120 – 250 g/ha	E. O. in Š. PLEVELI	oz. in jara pš., tritikala, rž	spomladi BBCH 12- 32 + močilo Nu-Film 0,1 L/ha
QUELEX	florasulam 10 + halauksifen 10,42	50 g/ha	Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ., rž, pira, tritikala), jara (pš., ječ.)	spomladi BBCH 21- 32 + dodatek močila
SAVVY	metsulfuron 20	30 g/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz. in jara (pš., ječ., oves, tritikala)	uporaba samo v času od 1. februarja do 1. avgusta; pš., oves, tritikala BBCH 12-39 ječ. BBCH 13-39
SEKATOR OD	amidosulfuron 10 + jodosulfuron 2,5	0,15 L/ha	E. Š. + nekateri VEČL. Š. PLEVELI	oz., jara pš., oz., jari ječ. rž, tritikala	BBCH 25 - 32
SEKATOR PLUS	2,4-D 28,7 + amidosulfuron 2,5 + jodosulfuron 0,625	0,6 L/ha	Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ., rž, tritikala), jara(pš., ječ.)	samo spomladi: ozimine: BBCH 21-32 jarine: BBCH 13-32

Fitofarmacevtsko sredstvo	Aktivna snov (%)	Odmerek na ha	Delovanje na vrste plevelov	ŽITO (uporaba v žitu)	Čas rabe (BBCH žit), opombe
STARANE FORTE	fluroksipir 33,3	0,54 L/ha	E. Š. + nekateri VEČL. Š. PLEVELI	oz. in jara (pš., ječ.), oves, rž, tritikala, pira	BBCH 21 - 32
STOMP AQUA	pendimetalin 45,5	2,9 L/ha	E. O. PL. in nekateri Š. PLEVELI	oz. pš., durum pš., oz. ječ., oz. rž, tritikala, jari ječ.	BBCH 00 – 30, jari ječ. pred vznikom BBCH 00 – 07
SUNDA	fenoksaprop-p 6,9	1,2 L/ha	O. PLEVELI	oz. (pš., rž, tritikala),	BBCH 10-32
SUNDA	fenoksaprop-p 6,9	1,0 L/ha	O. PLEVELI	jara (pš., ječ.)	BBCH 10-32
TIMELINE FX	florasulam 0,175 + fluroksipir 7,5 + pinoksaden 3	1,5 - 2,0 L/ha	nekateri O. in Š. PLEVELI	oz. in jara pš.	BBCH 13-37
*U 46 M-fluid	MCPA – DMA 94,3	1,0 L/ha	E. in VEČL. Š. PLEVELI	oz. in jara (pš., ječ., rž, tritikala)	BBCH 23-39
VALENTIA	fluroksipir 20 +florasulam 0,2	1,2 – 1,6 L/ha	E. Š. + nekateri VEČL. Š. PLEVELI	oz. (pš., ječ., durum pš., oves)	BBCH 13-45, oz. oves BBCH 13-31
VALENTIA	fluroksipir 20 +florasulam 0,2	1,2 – 1,5 L/ha	E. Š. + nekateri VEČL. Š. PLEVELI	jara (pš., ječ., rž, tritikala)	BBCH 13-39
XANADU	bensulfuron 50 + metsulfuron 4	100 g/ha	E. Š. PLEVELI	oz., jara pš. (tudi durum pš.), ječ., oves, rž, tritikala	samo spomladi, ozimine (BBCH 21-39) jarine (BBCH 13-39)
ZEPPPOS	jodosulfuron 0,6 + mezosulfuron 3	400 g/ha	E. Š. in O. PLEVELI	oz. pš., rž, tritikala	samo spomladi BBCH 21-32

Legenda kratic in okrajšav

Čas rabe: Faza razvoja žit po BBCH;

- BBCH 00: takoj po setvi
- BBCH 13: tretji list razgrnjen
- BBCH 21: začetek razraščanja, prvi stranski poganjek zaznaven
- BBCH 25: sredina razraščanja
- BBCH 30: začetek kolenčenja
- BBCH 31: 1. kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja
- BBCH 32: 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem
- BBCH 37: viden zgornji list (zastavičar), je še zvit
- BBCH 39: zastavičar že popolnoma zravnčan
- BBCH 49: vidne prve rese

Vrsta plevela:

- E: enoletni
- VEČL: večletni
- DVOL: dvoletni
- O: ozkolistni
- Š: širokolistni

Okrajšave za žita

- oz.: ozimno žito
- pš.: pšenica
- ječ.: ječmen

* FFS - za fitofarmacevtsko sredstvo velja prepoved uporabe na (VVOI) - najožjih vodovarstvenih območjih in pri pridelovalcih vključenih v operacije Vodni viri, Ohranjanje kolobarja – stopnja III in

V Sloveniji dovoljeni selektivni herbicidi za spomladansko rabo v žitih v letu 2025. S. Žveplan, IHPS

Varovalni pasovi ob vodotokih intervencije IRP 18.02 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Naravni viri (KOPOP – Naravni viri) iz Strateškega načrta SKP 2023–2027.

MU = manjše uporabe (»Učinkovitost in fitotoksičnost FFS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo tega FFS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik«).