

## Seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v posevkih fižola v letu 2026

Pridelovalci fižola so v preteklih dneh pričeli s saditvijo fižola, zgodnejši posevki so v zgodnjih fazah kalitve. Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v posevkih fižola.

Seznam je objavljen v okviru izdaje prognostičnih obvestil na Portalu prognostičnih obvestil

[Povezava na register Fitofarmaceutskih sredstev UVHVVR \(MKGP\)](#)

**Silvo Žveplan, 4. maj 2026**



**Preglednica 1: Selektivni herbicidi, registriranih v Sloveniji v letu 2026, za uporabo v nasadih fižola po setvi pred vznikom fižola in plevelov**

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe fižol BBCH	Karenca in opombe
<b>BOXER</b> O. in Š. pl.	prosulfokarb	EC	5,0 L	Preem	ČU, zagotovljena mora biti dobra pokritost semena (globina setve najmanj 8 cm).
<b>CHANON</b> nekatero vrste E. Š. in O. pl.	aklonifen	SC	3.0 L	Preem, po setvi pred vznikom fižola	ČU, manjša uporaba, v fižolu (za sveže in suho zrnje).
<b>CHIMRO, CLOMATE</b> nekatero vrste E. Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L	Preem, od faze suhega semena do vznika korenin BBCH 00-05	ČU, v fižolu (za suho in sveže zrnje ter stročje).
<b>FRESCO</b> E. Š. in O. pl.	metobromuron	SC	2,0 L	Preem	ČU, samo v fižolu za stročje in sveže zrnje. Uporaba za pridelavo fižola za suho zrnje ni dovoljena!
<b>STOMP AQUA</b> E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	CS	2,9 L	Preem	ČU, manjša uporaba.

**Legenda:**

- E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni,
- pl. – pleveli,
- F - formulacija herbicida,
- Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov,
- Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka,
- razvojnica faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista fižola,
- ČU- karenca je zagotovljena s časom uporabe,
- FFS – fitofarmacevtsko sredstvo.

**OPOZORILO: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!**

**Preglednica 2: Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2026, za uporabo v nasadih fižola po vzniku fižola in plevelov**

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe fižol BBCH	Karenca in opombe
<b>AGIL 100 EC</b> E. in Večl. O. pl.	propakvizafop	EC	0,75 - 1,5 L	Po, BBCH 13-29	60 dni.
<b>*BASAGRAN 480, *BENTA 480 SL,</b> E. in nek. Večl. Š. pl.	bentazon	SL	2,0 L v deljeni (split) aplikaciji (1,0 + 1,0 L), med aplikacijama 7-14 dni	Po, BBCH 12-14 do višine posevka največ 5 cm	ČU, uporaba pri temperaturah do 25 °C! fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje).

Seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v posevkih fižola v letu 2026

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe fižol BBCH	Karenca in opombe
<b>FOCUS ULTRA</b> E. O. in samosevci žit Večl. O. pl.	cikloksidim	EC	2,0 - 4,0 L	Po, BBCH 12-19	56 dni fižol v zrnju (suh), 28 dni fižol v stroku, E. oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29), večletni oz. pl. do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15).
<b>FREQUENT</b> E. in Večl. O. pl.	fluazifop-p-butil	EC	2,0 - 3,0 L	Po, BBCH 11-50 od vznika do začetka cvetenja	42 dni, fižol (za stročje in zrnje).
<b>FUSILADE FORTE</b> E. O. pl. in ljulk (Lolium spp.)	fluazifop-p-butil	EC	0,8 - 1,3 L	Po, pred cvetenjem do BBCH 50	90 dni fižol za suho zrnje, 28 dni fižol za stročje.
<b>FUSILADE MAX</b> E. in Večl. O. pl. in ljulk (Lolium spp.)	fluazifop-p-butil	EC	1,6 L	Po, pred cvetenjem do BBCH 50	90 dni fižol za suho zrnje, 28 dni fižol za stročje.
<b>SELECT SUPER</b> E. O. pl.	kletodim	EC	1,0 L	Po, BBCH 12-19	30 dni, fižol (za stročje in sveže zrnje).
<b>WISH TOP</b> E. O. pl. in plazeča pirnica (Elymus repens) (ni v prodaji v 2024, v 2025)	kvizalofop-p-etil	EC	0,5 L 1,1 L - plazeča pirnica	Po, BBCH 12-29	50 dni, manjša uporaba, fižol (za stročje in sveže zrnje).

**Legenda:**

- E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni,
- pl. – pleveli,
- F - formulacija herbicida,
- Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov,
- Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka,
- razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista fižola,
- ČU- karenca je zagotovljena s časom uporabe,
- FFS – fitofarmacevtsko sredstvo.

**Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!**

\* FFS - za fitofarmacevtsko sredstvo velja prepoved uporabe na (VVOI) - najožjih vodovarstvenih območjih in pri pridelovalcih vključenih v operacije Vodni viri, Ohranjanje kolobarja – stopnja III in Varovalni pasovi ob vodotokih intervencije IRP 18.02 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Naravni viri (KOPOP – Naravni viri) iz Strateškega načrta SKP 2023–2027.

**Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve.**