



## Podatki o publikaciji:

Izdaja: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije  
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec  
Urednik: dr. Magda Rak Cizej  
E-pošta uredništva: [magda.rak-cizej@ihps.si](mailto:magda.rak-cizej@ihps.si)

ISSN 2536-2062, Letnik 43, št. 1, 13. februar 2026

---

## 1 Seznam fitofarmaceutskih sredstev dovoljenih za varstvo hmelja v Sloveniji v letu 2026; stanje na dan 12. februar 2026 (M. Rak Cizej)

V prilogi vam posredujemo Seznam fitofarmaceutskih sredstev, dovoljenih za uporabo v hmelju v Sloveniji v letu 2026. Seznam predstavlja presek registriranih fitofarmaceutskih sredstev (FFS) v Sloveniji (vir: [Register fitofarmaceutskih sredstev](#), stanje na dan 12. februar 2026), mejnih vrednosti ostankov FFS na hmelju, določenih v EU, ZDA in na Japonskem, ter zahtev večjih slovenskih kupcev hmelja. Opozarjamo vas, da se je pred uporabo posameznih FFS smiselno predhodno posvetovati s svojim kupcem hmelja, zlasti v primerih, ko za določeno sredstvo niso znane izvozne tolerance za državo, v katero boste hmelj izvažali.

## 2 Dovoljenje za nujne primere za Movento SC 100 in Fonganil (M. Rak Cizej)

Sporočamo vam, da je Hmezad exim d.o.o. pridobil dovoljenje za nujne primere za uporabo sistemičnega insekticida in akaricida **Movento SC 100 (spirotetramat)** na hmelju za leto 2026. Dovoljenje je izdano za zatiranje hmeljeve listne uši (*Phorodon humuli*) v odmerku od 0,3 do 1,5 L/ha ter za zatiranje pršic (Acaridae) v odmerku 1,5 L/ha.

Dovoljenje za nujne primere za uporabo Movento SC 100 je izdano za obdobje 120 dni in velja **od 13. 4. 2026 do 10. 8. 2026**. Distributer pripravka je Hmezad exim d.o.o., zato se glede vseh podrobnosti o njegovi dobavi obrnite neposredno nanje, če se z njimi še niste dogovorili.

Prva tako vam sporočamo, da je Hmezad exim d.o.o. pridobil dovoljenje za nujne primere za uporabo sistemičnega fungicida **Fonganil (metalaksil-M)** na hmelju za leto 2026. Dovoljenje je izdano za zatiranje primarne okužbe hmeljeve peronospor (*Pseudoperonospora humuli*) v odmerku 0,2 mL na rastlino ob najvišji uporabi 0,8 L/ha.

Dovoljenje za nujne primere za uporabo FFS Fonganil je izdano za obdobje 120 dni in velja **od 16. 2. 2026 do 15. 6. 2026**. Distributer pripravka je Hmezad exim d.o.o., zato se glede dobave obrnite neposredno nanje.

## 3 Pred nakupom gnojil (B. Čeh)

Zgodaj spomladi še pravočasno preverite, ali imate izdelan gnojilni načrt in veljavne analize tal. Če ne, še lahko vzamete vzorce, naročite analize in na tej osnovi pripravite gnojilni načrt ter nabavite primerna gnojila.

Za zanesljive rezultate je ključen pravilen odvzem: vzorčite le dovolj suha tla (vsaj 3 dni po dežju) in si vzemite čas, da dobite reprezentativen povprečni vzorec. Napačen odvzem pomeni napačno analizo, posledično pa neustrezno svetovanje in gnojenje.

Vzorčite 20–25 mest diagonalno ali cik-cak po izenačeni parceli; če so razlike v tleh ali pridelku znotraj hmeljišča, vzorčite odseke ločeno. Vzorčite v vrstnem in medvrstnem prostoru; na vsaki točki odvmite za pest velik vzorec, odstranite rastlinske ostanke, podvzorce zberite v vedro in jih dobro premešajte. Vzorčite s sondo (možna izposoja na IHPS); za analizo oddajte približno 0,5 kg zemlje.

# Hmeljarske informacije

Vzorec označite z: imenom in priimkom, naslovom in telefonom, nazivom parcele, teksturo tal (lahka/srednja/težka), kulturo (hmelj), globino odvzema in zelenimi analizami. Osnovno analizo (pH, P, K) je priporočljivo ponoviti na 4–5 let; ob težavah v nasadu pa tudi razširjene analize po dogovoru s strokovnjakom IHPS.

Ne vzorčite nekaj mesecev po gnojenju s hlevskim gnojem ali apnjenju, ne prej kot en mesec po mineralnem gnojenju in ne neposredno po dežju. Izogibajte se robovom parcel ter posebnostim (kup gnoja, kamenje ipd.). Priporočil za P in K se držite 4–5 let, nato analizo ponovite; pri izbiri gnojila upoštevajte dejansko oskrbljenost tal (npr. presežek P in primanjkljaj K zahtevata drugačno razmerje hranil v gnojilu).

## 4 Naročila za certificirane sadike hmelja (M. Oset Luskar)

Ena izmed dejavnosti IHPS, ki je tudi vzdrževalec slovenskih sort hmelja, je pridelava certificiranega sadilnega materiala – oz. certificiranih sadik hmelja. Za sajenje hmelja pomladi 2027 sprejemamo naročila za vzgojo certificiranih sadik hmelja (sezona razmnoževanja v letu 2026).

**Pridelava certificiranih sadik hmelja temelji na osnovi predhodnih naročil, sistem za naročanja sadik hmelja na IHPS je sledeč:**

Naročilo izvedete preko [spletnega obrazca](https://www.ihps.si/kategorija-izdelka/sadike-hmelja/): <https://www.ihps.si/kategorija-izdelka/sadike-hmelja/> (nujna je izpolnitev vseh vsebin označeno z zvezdico).

V primeru zapolnitve kapacitet že vrsto let velja, da ima prednost datumsko prej oddano naročilo. **Naročila sprejemamo do konca aprila 2026.**

Vezano na sortno strukturo v slovenskih hmeljiščih in ker je težko pridobiti jasno napoved glede nadaljnje sortne politike, je IHPS po predhodnem posvetu s trgovci s hmeljem določil obseg razmnoževanja. Obseg števila osnovnih matičnih rastlin, ki so namenjene razmnoževanju, je določen iz deleža posajenih posameznih sort hmelja v slovenskih hmeljiščih. To pomeni, da za sorte, ki so zastopane v večjem deležu – najmanj 10 % in več v pridelavi, ohranjamo število matičnih rastlin s katerim zagotovimo število sadik za 8 - do 10 % letno obnovo glede na zasajeni obseg sorte (št. ha) v pridelavi. To velja za sorte **Aurora, Celeia, Bobek, Savinjski golding in Styrian gold**.

Za druge sorte v pridelavi, za katere se v zadnjih letih ne izkazuje večjega interesa, to so **Styrian Wolf, Styrian Eureka, Dana, Styrian Cardinal, Styrian Eagle, Styrian Kolibri, Styrian Dragon, Styrian Fox ter novejši sorti 31B26 in 90A263**, pa imamo manjše število osnovnih matičnih rastlin. Zato bodite z naročili za te sorte pravočasni.

V primeru zanimanja za naročilo novih sort, predstavljenih na seminarju, za sajenje v letih 2027/28, nas prav tako prosimo osebno kontaktirajte.

**Prednost certificiranih sadik hmelja pred necertificiranim sadilnim materialom:**

- sadike s certifikatom kakovosti so brez škodljivih virusov, viroidov in talnih gliv,
- opažena je višja toleranca rastlin na ekstremne vremenske pogoje,
- opažena je višja toleranca rastlin na ekstremne vremenske pogoje,
- zagotovljena je sortna pristnost v hmeljišču,
- pričakovan je do 20 % višji pridelek z višjimi vsebnosti alfa-kislin